Perfil de Riesgo de Personas con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+ 2016-2017

# INFORME FINAL DE LA ENCUESTA REALIZADA EN GUATEMALA

Mayo 2017

**Comité Regional para la actualización del Protocolo de Investigación Perfil de Riesgo de Personas con VIH de Centroamérica 2016-2017**

| **Nombre** | **Institución** |
|---|---|
| Sra. Arely Cano | ICW International Community of Women living with HIV/AIDS. |
| Sra. Haydee Laínez | Orquídeas del Mar; punto focal RedTraSex |
| Dra. Elizabeth Rodríguez | OPS/OMS |
| Dra. Celina Miranda | ONUSIDA El Salvador |
| Dra. Alice Pineda Whitaker | Investigadora Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN) |
| Lic. Marco Vinicio Fournier | Investigador Investigaciones Psicosociales S,A, |
| Dra. Sandra Barahona | COMISCA |
| Lic. Otoniel Ramírez | Secretario Regional REDCA+ |
| Dra. Evelyn Cardoza | M&E Programa Regional REDCA+ |
| Dra. Julissa Mena | Directora Regional, Programa Regional REDCA+ |

**Asistencia técnica:** Julissa Mena y Evelyn Cardoza

**Investigador Principal**: Marco Vinicio Fournier

**Organización responsable del trabajo de campo**: ITPC LATCA

**Coordinación del trabajo de campo**: José Jiménez

# RESUMEN EJECUTIVO

Durante el primer semestre de 2017, la Red Centroamericana de Personas viviendo con VIH (REDCA+) implementó una nueva versión del estudio Perfil de Riesgo de Personas con VIH, con el fin de actualizar las características sociodemográficas de la población de Personas con VIH, así como la identificación de las características asociadas con el uso del condón y lubricante en la última relación sexual, la adherencia a TAR en los últimos 12 meses, condiciones de salud, actividad sexual, victimización y conocimientos sobre VIH. Los resultados de este estudio permitirán apoyar el diseño de estrategias y la toma de decisiones programáticas en cada país. El estudio se realizó en siete países de la región: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondura, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

El presente informe muestra los resultados correspondientes a Guatemala. A continuación, se resumen los objetivos, la metodología, los resultados y las principales conclusiones de la investigación.

## I. OBJETIVOS

### A. Generales

1- Describir las características socio demográficas, el comportamiento vinculado al VIH y el uso de servicios atención de salud de las Personas con VIH en Guatemala.

2- Contribuir al diseño de acciones de incidencia política para mejorar el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la atención por el VIH, la aceptabilidad de los servicios de las Personas con VIH y su adherencia al tratamiento antirretroviral, así como las políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH.

### B. Específicos:

1- Identificar el nivel de participación de las Personas con VIH en grupos de apoyo.
2- Determinar las actitudes hacia diversas estrategias de incidencia política y la disposición a participar en cada una de ellas.
3- Valorar la perspectiva de futuro que posee cada una de las personas entrevistadas.
4- Enumerar las estrategias de control de la salud sexual y reproductiva según sexo.
5- Medir el conocimiento y las actitudes hacia el VIH.
6- Identificar el nivel de acceso al condón y al lubricante y su frecuencia de uso.

7- Valorar la condición de salud actual y el acceso a servicios de calidad.
8- Identificar el nivel de adherencia al tratamiento antirretroviral y los factores asociados a la misma.
9- Establecer el nivel de victimización existente a causa de su estatus como persona con VIH.
10- Enumerar las conductas sexuales de riesgo según los diferentes tipos de pareja.
11- Determinar las características sociodemográficas de las personas entrevistadas.
12- Comparar los resultados según país, identidad de género, edad, nivel educativo, perspectiva de futuro, tiempo desde que recibió el diagnóstico de VIH, orientación sexual.
13- Identificar acciones e iniciativas que puedan favorecer un mejoramiento de la calidad de vida de las Personas con VIH.

## II. METODOLOGÍA

El estudio fue de corte transversal con una muestra de Personas con VIH entrevistadas aleatoriamente en los servicios de salud y en organizaciones no gubernamentales.

En Guatemala se entrevistaron 507 personas. Dentro de cada centro de salud u organización seleccionados se escogió a las personas a entrevistar mediante un procedimiento sistemático, escogiendo a las personas en función de su presentación. El procedimiento de muestreo utilizado y el tamaño sugerido permite trabajar con un nivel de error máximo de 4,6% y con un nivel de confianza del 95%, asumiendo variabilidad máxima en las distribuciones proporcionales.

La información se obtuvo mediante entrevistas personales cara a cara, utilizando como guía un cuestionario estructurado diseñado en conjunto en primer taller programado especialmente para este fin y constituido por personal de REDCA+ y por el Comité Regional para la actualización del protocolo. Una vez establecida una primera versión del cuestionario, se realizó un segundo taller con personal de REDCA+, con representantes de cada una de las organizaciones de cada país participante y por el consultor metodológico, en donde se estableció la versión definitiva de la guía de entrevista.

La recolección de la información en Guatemala estuvo a cargo de la organización ITPC LATCA y bajo la dirección de José Jiménez.

La información obtenida se procesó electrónicamente para obtener distribuciones de frecuencia de cada pregunta del cuestionario, así como tablas de contingencia para preguntas claves de cada sección, con su respectiva prueba de significancia según la distribución Chi Cuadrada. Adicionalmente, se combinaron diferentes preguntas para calcular indicadores mediante adición de respuestas, previa transformación unidireccional. Estos indicadores también fueron cruzados por variables de control y se evaluó el nivel de significancia de diferencias de promedios basándose en la distribución t de Student o F de Fisher, según la cantidad de categorías de cada variable de control.

# III. RESULTADOS

## 1. Condición socioeconómica:

El niel socioeconómico de las personas entrevistadas a ser limitado. El nivel educativo es bastante bajo y un nivel de ocupación limitado y de baja remuneración. El indicador de condición socioeconómica muestra un promedio de 40 en una escala de 0 a 100 y dos terceras partes de las personas poseen un nivel medio bajo.




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

La mitad de las personas no se encontraban trabajando al momento de la entrevista, 21,8% se consideraba desempleado y una proporción importante se desenvuelve en el sector informal.

Entre las que sí trabajan, la gran mayoría no logra cubrir sus necesidades básicas ni las de sus dependientes.

## 2. Participación

El nivel de participación en grupos de apoyo tiende a ser muy bajo (24,5%). Aunque la participación en actividades relacionadas con el VIH en los últimos doce meses aumenta a 49,9%.

Por otra parte, al solicitar que especifiquen de qué forma podrían colaborar a controlar la epidemia, la mayoría se refiere a acciones individuales y relacionadas con su cuidado persona,l como el uso del condón o el tomar medicamentos.




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

La experiencia de participación en actividades de incidencia política tiende a ser baja, a excepción de la asistencia a reuniones de personas con VIH y el portar una insignia o botón. Además, prevalece una percepción relativamente baja de estas actividades, con un promedio de 57,7 en una escala de 0 a 100. La percepción resulta un poco mejor entre las personas que solo estudian.

## 3. Perspectiva de futuro

Se observa un nivel bastante alto de optimismo hacia el futuro, con un 85,8% de las personas afirmando que tienen planes definidos para los próximos años, el 90,4% opina que puede cambiar positivamente su futuro y el 83,4% considera que estará mejor que ahora.




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El índice de perspectiva de futuro muestra un promedio de 88,4 en una escala de 0 a100. Este indicador tiende a ser superior entre las personas de 26 a 40, entre las que se identifican con el género masculino, en los niveles educativos superiores, entre las personas que laboran en una ONG o en la empresa privada, las personas con menor tiempo de haber recibido su diagnóstico y entre las personas que mejor perciben su estado de salud actual.

## 4. Nivel de conocimientos sobre VIH




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El nivel de conocimientos básicos sobre el VIH resulta bueno, con un promedio de 81,7 en una escala de 0 a 100. El nivel de conocimientos tiende a ser superior entre las personas más jóvenes, aquellos que se identifican con el género masculino, las de mayor nivel de estudios, las que estudian y trabajan, las que trabajan en una ONG, los hombres que tienen sexo solo con hombres y quienes tienen mayor tiempo desde el diagnóstico.

Específicamente, la mayoría de las personas menciona que la mujer deber ponerse en control médico y tomar sus medicamentos antirretrovirales para evitar la transmisión de madre a hijo. Del mismo modo, el 78,8% está consciente de que las personas con VIH pueden reinfectarse y el 92,9% está de acuerdo con que usando el condón de manera correcta se puede prevenir la reinfección. Un 40,6% considera que su riesgo de reinfectarse es medio o alto, mientras que un 42,2% considera que es bajo. Ante la pregunta sobre qué puede hacer una persona con VIH para prevenir la reinfección, el 92,1% menciona el uso del condón en toda relación sexual.

## 5. Acceso al condón




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El nivel de acceso al condón resulta muy bajo entre las personas entrevistadas. Este indicador muestra un promedio de apenas 29,8 en una escala de 0 a 100.

El acceso resulta superior según nivel de estudios, concentrándose el mayor acceso en los niveles superiores y resulta mejor entre las ocupaciones de nivel medio. También existen mejores promedios entre los empleados de una ONG y entre los hombres que tiene sexo solo con hombres.

El 92,9% menciona el centro de salud como lugar para conseguir condones, mientras que la farmacia es mencionada por el 82,3% y el supermercado por solo el 58,3%. La mayoría de las personas entrevistadas afirma que la última vez que recibió condones gratis fue hace varios meses y cerca de la mitad dice haber recibido una docena o menos.

## 6. Acceso a lubricante




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El nivel de acceso a lubricantes resulta moderado, con un promedio de 48,5. El 55,1% de las personas entrevistadas muestra un nivel muy bajo, mientras que solamente un 27% presenta un acceso muy alto.

El acceso al lubricante es superior entre las personas de menor edad, entre las mujeres trans, las personas de mayor nivel de estudios, entre aquellas que solo estudian, las que trabajan como profesionales, las que trabajan en una ONG, entre los hombres que tienen relaciones sexuales solo con hombres, las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico, mejor percepción del estado de salud y si tiene pareja estable.

La mayor parte de las personas entrevistadas afirma conocer los lubricantes.

Entre las personas que sí conocen los lubricantes, la gran mayoría menciona el centro de salud y la farmacia como lugares donde conseguirlos. El 42,2% de las personas que lo conocen solo lo utiliza a veces y un 24,9% dice no hacerlo nunca. Cuando sí se usa, la inmensa mayoría de las veces es uno a base de agua. Casi la mitad de las personas afirma disponer de ellos en el momento de la entrevista y un 65,7% afirma recibir lubricantes cuando le regalan condones.

## 7. Acceso a servicios de salud de calidad




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El nivel de acceso de las personas entrevistadas a servicios de salud de calidad resulta moderadamente bajo, con un promedio de 45,4, en una escala de 0 a 100. El 57,3% de las personas entrevistadas tiene un nivel medio bajo de acceso a servicios de salud de calidad, mientras que solo un 2,6% muestra un nivel muy alto.

El nivel de acceso mejora entre las personas con menor edad, menor nivel de estudios, entre técnicos medios y personal de apoyo administrativo y peor percepción del estado de salud.

Cerca de dos terceras partes de las personas entrevistadas recibieron consejería antes de realizarse el examen de VIH y el 79,6% afirma haber recibido también después de resultar positiva la prueba. Cuando asiste a control, la mayoría de las personas recibe atención sobre todo de un médico especialista y consejería.

A un 35,6% le han cambiado alguna vez el esquema de antirretrovirales, a la gran mayoría de estos se le ha informado al darle un nuevo tratamiento y a un 64,6% se le ha solicitado su consentimiento. Por otra parte, al 88,7% se le informa sobre los posibles efectos secundarios.

Solamente un 5,7% ha tenido que pagar por servicios de salud públicos, mencionando la consulta a especialista y los medicamentos, mientras que un 20,5% asegura que ha tenido que pagar servicios de salud privados, sobre todo la consulta general y los exámenes de laboratorio.

## 8. Tratamiento antirretroviral




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El 93,7% de las personas entrevistadas asegura estar tomando medicamentos antirretrovirales al momento de la entrevista.

El uso de los medicamentos resulta más frecuente entre las personas con mayor tiempo de haber recibido su diagnóstico.

La variedad de medicamentos mencionados es muy grande, pero sobresalen Atripla, Efavirenz, y Lamivudina.

El 56,2% de las personas que están tomando medicamentos antirretrovirales asegura que no ha tenido efectos adversos.

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

Un 12,4% de las personas acepta haber interrumpido el tratamiento por decisión propia en los últimos 12 meses.

La suspensión resulta más frecuente entre las personas que trabajan para el Gobierno.

Las principales razones para interrumpir se relacionan con los efectos secundarios, la dificultad para trasladarse y la dificultad de recordar.

Existe, además, un 10,7% que reconoce haber dejado de tomar los medicamentos para poder ingerir alcohol u otras drogas y un 8,4% que acepta haber olvidado retirar sus medicamentos al menos una vez en el último año.

A un 3,3% de las personas le han dejado de suministrar los medicamentos en el centro de salud.

## 9. Percepción del medicamento antirretroviral




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

La percepción que tienen las personas entrevistadas sobre los medicamentos antirretrovirales resulta en general bastante positiva, con un promedio de 84,6.

El 70,4% de las personas entrevistadas presenta una percepción muy positiva ninguna persona muestra una actitud muy negativa.

La percepción resulta más positiva entre las personas que laboran en empresa privada o en servicios domésticos (ver cuadro #241), las que tienen mayor tiempo de haber recibido su diagnóstico (ver cuadro #245), y entre las personas con una visión mejor de su salud.

Específicamente, el 85,6% opina que una persona que toma antirretrovirales se enferma menos, un 71,1% opina que vive más y un 66% que tiene menos probabilidad de transmitir el VIH.

## 10. Victimización




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El 83% de las personas entrevistadas muestra un nivel muy bajo de victimización, mientras que solamente un 1,7% muestra un nivel muy alto. El nivel de victimización por estigma y discriminación asociadas a la condición de ser una persona con VIH tiende a ser relativamente bajo, con un promedio de 15,3 en una escala de 0 a 100.

La victimización tiende a ser superior entre las personas de menor edad, los hombres trans, entre las personas inactivas, las que laboran en puestos de apoyo administrativo, la percepción negativa del estado de salud y la actividad sexual entre los hombres.

El nivel mayor de victimización corresponde a situaciones de ofrecimiento de favores o regalos a cambio de tener relaciones sexuales. Por otra parte, un 7,8% de las personas afirma que ha sido víctima de algún maltrato en los servicios de salud y un 25,9% considera necesario ocultar su diagnóstico en los servicios de salud. A un 11,6% le han obligado a realizarse el examen del VIH por motivos de trabajo.

Menos de una cuarta parte de las familias de las personas entrevistadas desconoce el diagnóstico de VIH. Entre las otras tres cuartas partes, la reacción de la familia fue en su gran mayoría de apoyo.

## 11. Riesgo en las relaciones sexuales




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El nivel de riesgo en las relaciones sexuales resulta moderadamente bajo, con un promedio de 27,5 en una escala de 0 a 100. Un 58% de las personas muestran un nivel muy bajo de riesgo, pero un 52,9% se ubica en un nivel medio bajo y un 0,9% alcanza un nivel muy alto.

El riesgo resulta significativamente superior entre los hombres trans, entre las personas inactivas, el personal de apoyo administrativo y entre las que no tienen una pareja estable.

Poco más de la mitad de las personas entrevistadas no tenía una pareja estable al momento de la entrevista. Entre aquellas que sí la tenían, un 55,3% tienen una pareja con VIH y el 91,8% de las parejas conoce el diagnóstico de VIH de la persona entrevistada.

Por otra parte, un 25,6% de las personas entrevistadas acepta haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales. El 71,9% de las personas no sabe si su última pareja ocasional es una Persona con VIH y solo el 3,5% acepta siempre decirle a su pareja ocasional sobre su diagnóstico.

Solamente un 8,9% de las personas entrevistadas afirma haber tenido relaciones sexuales con una o un trabajador sexual en el último año.

Solo un 6,8% de las personas afirma haber desarrollado trabajo sexual comercial, de estas, el 74,2% nunca le dice a sus clientes que es una persona VIH.

## 12. Uso del condón




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El indicador que resume la información acerca del uso del condón presenta un nivel moderado, con un promedio de 63,6 en una escala de 0 a 100. Solamente un 0,2% muestra un nivel muy bajo en el indicador del uso del condón, aunque también solamente un 8,1% se ubica en un nivel muy alto. La mayor proporción (75,4%) se ubica en un nivel medio alto.

El uso del condón es significativamente inferior entre las mujeres trans, las personas sin educación formal, las que han migrado a otro país, entre las personas que trabajan en servicios domésticos, las mujeres que practican sexo tanto con hombres como con mujeres, las que tienen menor tiempo desde el diagnóstico, las que perciben su estado de salud como malo y las que no tienen una pareja estable.

En la última relación con la pareja estable, el 89,1% de las personas utilizó el condón y más de la mitad afirma que su uso es una decisión conjunta. Entre las personas que no lo utilizaron, la principal razón se concentra en el hecho de que la pareja no quiere usarlo, seguida de la confianza en la pareja.

Con parejas ocasionales el uso del condón en la última relación alcanza un 87,7%. Con trabajadores o trabajadoras sexuales, el uso del condón en la última relación fue de un 89,7%. Cuando la persona entrevistada practica el sexo comercial, el uso del condón fue de un 80%.

## 13. Uso del lubricante




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El nivel de uso del lubricante es inferior al observado para el condón. El promedio en este indicador es de 43,8 en una escala de 0 a 100. El 72,3% de las personas entrevistadas se ubica en un nivel medio bajo de uso del lubricante, mientras que solamente 0,2% alcanza un nivel muy alto.

El uso del lubricante resulta menor para las personas entre las personas que se identifican con el género femenino, las que trabajan como técnicos medios, las que trabajan como patronos con menos de 10 empleados, entre los hombres que practican sexo tanto con mujeres como con hombre y entre las que no tienen una pareja estable.

Un 52,7% afirma haberlo utilizado con su pareja estable en la última relación sexual.

Con parejas ocasionales, el uso del lubricante en la última relación resulta de apenas un 49,5%. Con trabajadores o trabajadoras sexuales el uso es de un 37,1%. Entre las personas trabajadoras sexuales, el uso del lubricante en la última relación fue de un 64,3%.

## A. Conclusiones

1- La condición socioeconómica de las personas entrevistadas tiende a ser baja, con más de un 31% de las personas entrevistadas con primaria incompleta o menos y cerca de la mitad sin trabajo remunerado, desempleada o dedicada a las tareas del hogar. Entre las que sí trabajan, una proporción importante lo hace en ocupaciones no calificadas con un 44,6% como cuenta propia, lo que sugiere una proporción importante en el sector informal. El ingreso tiende a ser limitado y difícilmente alcanza para cubrir las necesidades de la persona entrevistada y de sus familiares.

2- El nivel de participación en grupos de autoayuda es bastante bajo y apenas moderada la asistencia a actividades relacionadas con el VIH.

La percepción de las acciones de incidencia política tiende a ser más bien baja|.

3- Las personas entrevistadas tienden a mostrar en general una buena perspectiva de futuro,

4- El nivel de conocimientos sobre VIH es moderadamente bueno.

5- Existe un acceso alto al control médico y una asistencia igualmente alta al mismo. Pero permanece una proporción importante que no recibió algún tipo de consejería antes de realizarse la prueba que resultó en el diagnóstico de VIH. La mayoría de las personas dice recibir orientación al cambiársele el esquema de antirretrovirales y en general se le solicita su consentimiento.

La percepción del estado de salud es por lo general muy positiva y esta sensación se asocia positivamente con actitudes y prácticas preventivas.

6- El 93,7% de las personas asegura estar en tratamiento antirretroviral en el momento de la entrevista y todas reciben sus medicamentos en forma completa y gratuita en el centro de salud.

Se menciona una lista muy grande de diferentes medicamentos que se estaban tomando en el momento de la entrevista, pero sobresalen con mayor mención Atripla, Efavirenz, y Lamivudina.

La percepción del tratamiento antirretroviral tiende a ser muy positiva.

7- La adherencia al tratamiento antirretroviral es de 87,6% entre las personas entrevistadas.

Las principales razones para suspender el tratamiento se relacionan con los efectos secundarios, la dificultad para trasladarse y la dificultad de recordar.

8- La gran mayoría de las personas entrevistadas se ha realizado los exámenes CD4 y de carga viral en los últimos doce meses, pero poco más de una cuarta parte afirma desconocer sus resultados.

9- Solo cerca de una cuarta parte de las personas entrevistadas ha recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis.

10- En lo que respecta a la orientación para prevenir la hepatitis B, solo un 17,6% de las personas la ha recibido y un 2,2% ha sufrido esta enfermedad.

11- Existe un nivel moderadamente bajo de victimización por la condición de ser Persona con VIH.

12- El riesgo en las relaciones sexuales es moderadamente bajo.

13- El uso del condón es apenas moderado con las diferentes modalidades de parejas sexuales. El uso en la última relación es de 89,1% con parejas estables, de 89,1% con parejas ocasionales, de 89,7% con trabajadores o trabajadoras sexuales y 80% entre las personas que aceptan haber practicado trabajo sexual.

14- El uso del lubricante es bajo aunque la mayoría conocen de su existencia.

15- En relaciones con parejas ocasionales o en sexo comercial llama la atención las proporciones de personas que ignoran si su pareja es una Persona con VIH o que no le dicen a su pareja su situación.

16- El nivel educativo muestra relaciones muy importantes con actitudes y con conductas preventivas y obviamente también con el nivel de conocimientos sobre el VIH, por lo que se constituye en un predictor frecuente de los diferentes indicadores analizados.

17- Otro de los predictores frecuentes de los diferentes indicadores lo constituye el tiempo que ha transcurrido desde que se recibió el diagnóstico de VIH. Lo anterior sugiere un proceso de maduración que permite aprender a vivir con el virus en forma saludable y responsable.

18- Otra variable predictora importante es la situación de migración, en donde aquellas personas que han tenido que migrar a otro país muestran en general condiciones más negativas. Del mismo modo, las mujeres trans tienden a mostrar peores condiciones y mayores niveles de victimización.

## B. Recomendaciones

1- La condición socioeconómica de la población estudiada resulta bastante limitada, con bajo nivel educativo, alto desempleo, importante presencia de economía informal, ingresos limitados y muchos dependientes. Conviene, por lo tanto, pensar en mecanismos que puedan desarrollarse para incrementar las opciones de empleo o de producción y mejoramiento del nivel educativo.

2- La participación tiende a ser muy baja y hay poca conciencia de las opciones colectivas. Cualquier esfuerzo en el sentido de mejorar la identidad y la participación redundará en mayor disposición para la incidencia política y en mejores opciones de apoyo y promoción de derechos y de mejoras en la calidad de vida, lo cual a su vez redundará en una perspectiva de vida aún más alta.

3- Resulta necesario desarrollar mayores esfuerzos de prevención de la salud sexual, especialmente entre los hombres.

4- Prevalece una proporción nada desdeñable de personas que dice sufrir maltrato por su diagnóstico o que tiene que esconderlo al solicitar atención. La capacitación y sensibilización del personal de salud resulta entonces fundamental para reducir victimización y para incrementar el uso de los servicios y mejorar la calidad de los mismos. También resulta importante algún esfuerzo de divulgación entre empleadores para impedir que se obligue a las personas a hacerse el examen de VIH.

5- Aunque la cantidad de personas que se mantienen en tratamiento antirretroviral es muy alta, prevalece una proporción que reconoce haberlo suspendido al menos una vez. Conviene trabajar en este punto las principales razones de esta suspensión.

6- Pareciera mantenerse algún problema con el reporte de los resultados de los exámenes de laboratorio, por lo que se hace necesaria una coordinación con los centros de salud para promover una entrega más sistemática de los reportes a cada paciente.

7- Existe una proporción relativamente alta que asegura no haber recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis y sobre todo la hepatitis B, por lo que es importante evaluar este servicio particular en los centros de salud.

8- El uso del condón sigue siendo moderado. Deben intensificarse los esfuerzos para lograr aumentar las proporciones de uso sistemático. De acuerdo con las razones esgrimidas para no utilizarlo, es importante una mayor sensibilización entre las Personas con VIH para vencer las resistencias asociadas al condón, pero sobre todo para generar habilidades más asertivas para que puedan exigir a sus parejas este uso sistemático.

9- En el caso del lubricante es importante incrementar esfuerzos para aumentar la disponibilidad amplia para toda la población de Personas con VIH y un uso sistemático del mismo.

10- Debe ponerse también atención a la distribución de condones, pues pareciera que el acceso es bajo.

# INTRODUCCION

El 1 de abril del presente año, el Secretario General de la Naciones Unidas, Ban Ki-moon (Naciones Unidas, 2016a), presentó el informe titulado: *Acción acelerada para poner fin a la epidemia del sida*, en donde proponía los siguientes pasos para enfrentar la epidemia:

1- Inspirar los avances y abordar las deficiencias en la aplicación de la Declaración Política de 2011.
2- Promocionar todos los aspectos de la agenda de desarrollo sostenible para asegurar que nadie se quede atrás.
3- Pasar de las metas mundiales a las metas regionales y nacionales e intensificar la vigilancia para la rendición de cuentas ante la población.
4- Adoptar soluciones de desarrollo sostenible para encauzar por la vía rápida una respuesta al sida acelerada, basada en los derechos

A su vez, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a una Reunión de Alto Nivel para Poner Fin al sida (Naciones Unidas, 2016b; ONUSIDA 2015a), misma que tuvo lugar del 8 al 10 de junio de 2016 en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Entre otras cosas, se resalta:

1- La importancia crítica de la concentración y diversificación de los recursos en la etapa inicial para acelerar la respuesta al sida.
2- La Búsqueda de respuestas transformadoras al sida para contribuir a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
3- El logro del acceso a servicios, productos y prevención de calidad en la lucha contra el VIH al tiempo que se amplía la cobertura, se diversifican los enfoques y se redoblan los esfuerzos para combatir el VIH y poner fin a la epidemia del sida.
4- La Promoción de leyes, políticas y prácticas para permitir el acceso a los servicios y poner fin a la estigmatización y la discriminación relacionadas con el VIH.
5- Aliento y apoyo a las personas que viven con el VIH, en riesgo de contraerlo o afectadas por él, así como otras partes interesadas en la respuesta al sida.
6- El aprovechamiento de los dirigentes y las instituciones regionales como esenciales para una respuesta más eficaz contra el sida.
7- El fortalecimiento de la gobernanza, la vigilancia y la rendición de cuentas que permitirá obtener resultados para y con las personas.

En esta etapa de transición en los aspectos de la gestión de los programas de atención a la infección al VIH, resulta de particular importancia la estrategia de control denominada *Cascada de la Atención* que establece indicadores precisos para la vigilancia que deben incluir una evaluación del acceso y la calidad de la atención a través del proceso continuado de la atención, que va desde el diagnóstico hasta la entrada en la atención y el tratamiento, la retención en servicios de atención y tratamiento, y el control de carga viral (Organización Panamericana de la Salud, 2014). Entre los indicadores que se vigilan, tienen una importancia especial los relacionados con 1- la proporción de personas viviendo con VIH que conocen su estatus, 2- la proporción de estas personas que se encuentra en tratamiento sostenido y 3-

proporción de las personas en tratamiento que muestran una supresión viral. Las Naciones Unidas se ha fijado la meta de un 90% para cada uno de estos tres indicadores para 2020 (ONUSIDA, 2014a).

Dentro de esta perspectiva de acción acelerada a corto plazo para garantizar mayor y mejor cobertura de los servicios de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas viviendo con VIH o afectadas por él, pasa necesariamente por un mayor involucramiento y participación activa de las personas viviendo con VIH o afectadas por él (ONUSIDA, 2015b).

En este sentido, resulta particularmente importante la estrategia metodológica de *Mayor Involucramiento de Personas Afectadas por el VIH* (MIPA en español o GIPA en inglés) (Alliance & GNP+, 2010), que busca la participación activa y directa de las personas viviendo con VIH en todas las acciones dirigidas a reducir la epidemia y a mejorar la calidad de vida de estas personas y en todas las etapas de programas y generación de políticas: concepción, desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación. Esta metodología parte del rechazo del presupuesto simplista y falso que define a los proveedores de servicios como aquellos que viven sin el VIH y a los clientes como los que sí viven con el virus. Por el contrario, se reconoce que la única forma de tener éxito en el enfrentamiento de la epidemia es a través del involucramiento directo de las PVVS en la prevención, el tratamiento, el cuido y el soporte. Este enfoque está basado en la perspectiva de Derechos Humanos y específicamente en el reconocimiento del derecho de estas personas a la autodeterminación y a la participación en decisiones que afectan su vida, el ignorar este principio necesariamente lleva a servicios y esfuerzos irrelevantes y a políticas inefectivas (ibídem).

Es dentro de este contexto histórico, político y metodológico que adquiere particular relevancia la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+), que integra a alrededor de 600 personas en nodos en cada una de las provincias, departamentos o distritos de cada uno de los siete países de la región, nodos que a su vez se organizan en 21 puntos focales. La red fue creada hace 15 años, en junio del año 2001. Cuenta, además, con un grupo asesor y un secretario general (REDCA+, s.f.). La organización nace con el cometido específico de garantizar acceso a una atención integral en salud, con acceso universal al tratamiento antirretroviral y para la defensa y promoción de los derechos humanos de las Personas con VIH, con especial énfasis en la reducción del estigma y la discriminación (REDCA+, 2016).

En el año 2007 REDCA+ recibió el aval político de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y desde 2008 recibe una subvención del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria, fondo administrado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) (REDCA+, 2014a y 2014b).

Para el quinquenio de 2015 a 2019, REDCA+ se ha propuesto tres objetivos estratégicos básicos (REDCA+, 2014a):

1- *Incidir políticamente para la estandarización, implementación y cumplimiento de las directrices de respuesta al VIH en la región centroamericana,*
2- *Garantizar que los derechos humanos de las Personas con VIH son respetados y se reduce el estigma y la discriminación*

3- *Fortalecer el posicionamiento de REDCA+ en la región, asegurando su solidez y la autosostenibilidad de sus iniciativas e intervenciones.*

Bajo esta perspectiva, REDCA+ ha propuesto un plan estratégico regional de incidencia política para el quinquenio 2015-2019 con los siguientes objetivos específicos (REDCA+, 2014b):

1- *Fortalecer los sistemas comunitarios a través del incremento de capacidades técnicas y jurídicas de las Personas con VIH y sus organizaciones sobre veeduría, contraloría social e incidencia política en relación al VIH, para la promoción y defensa de los Derechos Humanos en siete países de la región centroamericana, para el 2019.*
2- *Reducir las violaciones de los derechos humanos, el estigma y la discriminación a las Personas con VIH, mediante la generación y utilización de información estratégica documentada, en siete países de la región centroamericana, para el 2019.*
3- *Disminuir la violación a los derechos humanos de las Personas con VIH, a través de reformar los marcos legales en siete países de la región centroamericana, para el 2019.*

En el marco de las acciones que implementa REDCA+ en Centroamérica, se realizó, en el año 2010, un primer estudio para construir el "Perfil Socio Demográfico, Comportamientos Sexuales y Calidad de Vida". En ese momento, se contó con la información de cuatro países de la región: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. A partir de esta, se hizo un análisis de las características sociodemográficas, la presencia de redes sociales de apoyo, adicciones, comportamiento sexual, el uso de condón, presencia de infecciones de transmisión sexual, las condiciones de salud, las garantías de derechos humanos y la situación del estigma y discriminación. Se realizaron análisis descriptivos por país y comparativos entre países, lo que permitió conocer de mejor manera las condiciones de vida de las Personas con VIH. Finalmente, se propuso el uso del condón y la adherencia a la terapia antirretroviral como una aproximación a una mejora de la calidad de vida de las Personas con VIH. La principal dificultad metodológica del estudio de ese año fue que los instrumentos empleados en la recolección de datos y la temporalidad de la misma fueron diferentes en los cuatro países analizados, lo cual tuvo implicaciones importantes en el diseño de este perfil. Esto debido a los posibles sesgos en la medición, así como por la omisión de variables en los casos en los que no se obtuvo la información para los cuatro países. Se sugirió, a futuro, utilizar un instrumento estandarizado de recolección de datos, equivalencia en la temporalidad para la recolección de los mismos y la inclusión de variables que puedan dar una medición más precisa del perfil de riesgo que presentan las Personas con VIH.

En el marco de estos antecedentes, en marzo de 2012, se realizó un taller para la integración del instrumento de medición que sería empleado para la recolección de información para el estudio de ese mismo año. Para esto participaron actores claves en materia de prevención y control de VIH/sida en cinco de los siete países que integran la región; a partir del cual se realizó el levantamiento de datos en los siete países de la región de forma simultánea y con un mismo instrumento generando el estudio Perfil de Riesgo de Personas con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+, socializado durante el 2013.

Con el fin de ajustar y actualizar los diferentes indicadores y estadísticas de este estudio de 2012, se realizó una nueva ronda de recolección de información en los países de la región para el 2014. En esta ocasión se recabó información en seis de los siete países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Los resultados indican, entre otras cosas:

1- La población muestra un nivel socioeconómico limitado.
2- El nivel de identidad como grupo poblacional específico es bajo y la participación es también limitada.
3- El nivel de conocimientos sobre VIH es moderado.
4- Un 89,4% se mantiene en tratamiento antirretroviral y existe una buena imagen del mismo.
5- La adherencia es de 76,4% en menores de 24 años y de 82,7 % en personas de 24 o más años. Preocupa de manera especial la cantidad de personas que reconocen olvidar recoger sus medicamentos en el centro de salud.
6- Existe un alto porcentaje de personas con exámenes recientes de CD4 y carga viral, pero bajo conocimiento del resultado de los mismos, sobre todo para el segundo.
7- Existe un nivel moderado de victimización en los centros de salud y a la hora de buscar trabajo.
8- El uso del condón es moderado, con un uso sistemático de alrededor del 64% en los diferentes tipos de relaciones y el uso del lubricante es bajo.

Dos años después de este último estudio, resulta necesario actualizar indicadores y profundizar en las condiciones de vida de las Personas con VIH, sus niveles de participación, sus conductas sexuales y de prevención y el acceso a servicios de salud, exámenes de laboratorio y al tratamiento antirretroviral, así como la adherencia al mismo.

Durante el 27 y 28 de septiembre de 2016, se reunió un Petit comité conformado por socios técnicos de REDCA+ (OPS, ONUSIDA), Investigadores de universidades reconocidas de la región y representantes de las redes regionales que trabajan el tema de VIH se reunieron en El Salvador para revisar el protocolo del estudio de 2014 y definir los alcances, los contenidos y la metodología para este nuevo estudio de actualización. Específicamente, se definieron los contenidos conceptuales que sustentarán el proceso, la metodología a seguir para la obtención de la información, los contenidos del cuestionario y la estructura de los informes nacionales y regional. Se realizó una revisión y ajuste del instrumento de levantamiento de datos.

El presente informe describe en detalle los objetivos y el procedimiento metodológico, así como todos los resultados del estudio realizado en Guatemala, en los meses de marzo y abril de 2017.

# OBJETIVOS

El estudio tiene los siguientes objetivos:

## I. OBJETIVOS GENERALES

1- Describir las características socio demográficas, el comportamiento vinculado al VIH y el uso de servicios atención de salud de las Personas con VIH en Guatemala.

2- Contribuir al diseño de acciones de incidencia política para mejorar el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la atención por el VIH, la aceptabilidad de los servicios de las Personas con VIH y su adherencia al tratamiento antirretroviral, así como las políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH.

## II.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1- Identificar el nivel de participación de las Personas con VIH en grupos de apoyo.
2- Determinar las actitudes hacia diversas estrategias de incidencia política y la disposición a participar en cada una de ellas.
3- Valorar la perspectiva de futuro que posee cada una de las personas entrevistadas.
4- Enumerar las estrategias de control de la salud sexual y reproductiva según sexo.
5- Medir el conocimiento y las actitudes hacia el VIH.
6- Identificar el nivel de acceso al condón y al lubricante y su frecuencia de uso.
7- Valorar la condición de salud actual y el acceso a servicios de calidad.
8- Identificar el nivel de adherencia al tratamiento antirretroviral y los factores asociados a la misma.
9- Establecer el nivel de victimización existente a causa de su estatus como persona con VIH.
10- Enumerar las conductas sexuales de riesgo según los diferentes tipos de pareja.
11- Determinar las características sociodemográficas de las personas entrevistadas.
12- Comparar los resultados según país, identidad de género, edad, nivel educativo, perspectiva de futuro, tiempo desde que recibió el diagnóstico de VIH, orientación sexual.
13- Identificar acciones e iniciativas que puedan favorecer un mejoramiento de la calidad de vida de las Personas con VIH.

# METODOLOGÍA

## I. DISEÑO METODOLÓGICO

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se diseñó un procedimiento metodológico para implementar una encuesta con entrevistas cara a cara a una muestra de 450 personas que viven con VIH, en cada uno de los países de la Región Centroamericana, a saber: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Para lograr su meta, se confeccionó un cuestionario especial para la ocasión y se diseñó el procedimiento muestral en cada país. Seguidamente se capacitaron los equipos de entrevistadores/as y supervisores/as de cada país y se dió un seguimiento permanente al trabajo de campo desde su inicio hasta completar cada muestra. Los resultados obtenidos se procesaron estadísticamente y se elaboró un informe particular para cada país y uno global para toda la región.

## II. POBLACIÓN DE REFERENCIA

La recolección de la información se realizó en coordinación con los centros de salud, los grupos de apoyo y ONG que trabajan con la población de interés. Este es el medio más adecuado para localizar a Personas con VIH concentradas. Sin embargo, este procedimiento limita de manera muy importante la población de referencia, pues existe en cada país una diferencia grande entre la prevalencia reportada y la cantidad de Personas con VIH que asisten a los centros de salud. Ante esta situación resulta muy importante limitar los alcances de la generalización que se pretenda por país, de modo que en todos los casos se definirá la población del siguiente modo:

*Personas con VIH de 18 años o más que asisten a consulta a los centros de salud que brindan atención especializada para estas personas o que asisten a grupos de apoyo o a actividades sistemáticas de organizaciones no gubernamentales.*

Siendo así, se establecen los siguientes criterios de inclusión, tanto en la población como en la muestra:

- Ser persona diagnosticada con VIH
- Tener 18 años o más
- Dar su consentimiento informado en forma verbal para participar en el estudio

- Asistir a uno de los servicios de salud para Personas con VIH o a un grupo de apoyo o a actividades diseñadas en una ONG.

Por otra parte, se establecen los siguientes criterios de exclusión en la muestra:

- Persona bajo efecto de alcohol o drogas al momento de la entrevista
- Personas en crisis de salud física y/o mental

## III. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

En cada país el proceso de selección en los centros de contacto fue polietápico, escogiéndose como conglomerados primero los centros a visitar, incluyendo centros de salud, grupos de apoyo y ONG que trabajan directamente con Personas con VIH. Dentro de cada centro de salud u organización seleccionados se escogió a las personas a entrevistar mediante un procedimiento sistemático, escogiendo a las personas en función de su presentación al servicio de salud o al grupo correspondiente.

Se sugirió un tamaño fijo por país de 450 personas, muestra que permite trabajar con un nivel de error máximo de 4,6% y con un nivel de confianza del 95%, asumiendo variabilidad máxima en las distribuciones proporcionales.

## IV. CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE CAMPO

Con el fin de garantizar un trabajo de calidad en la selección de las personas a entrevistar, en el desarrollo de la entrevista, el manejo de la tableta y el registro de la información se implementó un proceso de capacitación. Mediante metodologías de exposición y de prácticas simuladas y reales se cubrió el siguiente temario:

1- Presentación del estudio.
2- Aspectos teóricos y prácticos relacionados con el Perfil de Riesgo de las Personas con VIH.
3- Importancia y alcances de la encuesta.
4- Procedimiento de selección, muestreo y posibles sesgos.
5- Manejo de la entrevista.
6- Principales motivadores e inhibidores durante la entrevista.
7- Estudio y discusión del cuestionario impreso.
8- Trabajo con el cuestionario impreso en ejercicios de simulación.
9- El programa SurveyToGo para el manejo de las entrevistas con tabletas.
10- Práctica simulada para el manejo de las tabletas y del programa SurveyToGo.
11- Práctica en el campo con entrevistas usando la tableta.

Para orientar y normalizar el trabajo de campo, se elaboró un Manual del/la Entrevistador/a que brinda toda la información necesaria para que cada persona entrevistadora realice su trabajo con objetividad y precisión. Además, se contó también un Manual del/la Supervisor/a de Campo.

## V. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información fue obtenida mediante entrevistas personales cara a cara, utilizando como guía el cuestionario estructurado diseñado especialmente para este estudio, revisado en el Petit Comité de setiembre y actualizado por Marco Vinicio Fournier y posteriormente en reunión de coordinación con las organizaciones de cada país encargadas del trabajo de campo. El cuestionario fue, además, traducido al inglés para su aplicación en Belice.

Con el fin de mantener el principio MIPA, la recolección estuvo a cargo de Personas con VIH que entrevistaron en los centros seleccionados. En el caso de Guatemala, el equipo de entrevistadores estuvo coordinado por la organización ITPC LATCA y bajo la dirección de José Jiménez.

Antes de cada entrevista se solicitó el consentimiento informado a cada persona seleccionada.

El trabajo de campo fue supervisado permanentemente desde San José, mediante el análisis de los registros que se iban almacenando en la base de datos que establece el programa SurveyToGo.

## VI. USO DE LAS TABLETAS Y DEL PROGRAMA SURVEYTOGO

La posibilidad de utilizar tarjetas electrónicas para el desarrollo de la entrevista y para el registro de la información implica una serie de ventajas importantes, en comparación con el cuestionario impreso, entre otras, pueden mencionarse las siguientes:

- Menos gasto de papel, con una mayor protección a nuestros bosques
- Un control muy preciso del desarrollo de la entrevista, de modo que es la máquina la que determina cuándo y cómo hacer los pases e impide que alguna pregunta quede sin respuesta.
- El registro de cada entrevista se adiciona inmediatamente a la base de datos vía Internet, de modo que se tiene un control día a día del trabajo realizado y permite una retroalimentación inmediata a cada entrevistador/a sobre posibles problemas en el desarrollo de la entrevista o en el registro de la información.

## VII. PROCESAMIENTO INICIAL DE LA INFORMACIÓN

La base de datos producida por la aplicación SurveyToGo fue procesada electrónicamente para obtener una primera limpieza del archivo, asegurando que no existan valores fuera de rango, contradicciones entre preguntas y usos inadecuados de pases. Todo esto es prácticamente imposible cuando se utilizan tabletas para levantar los datos, pero de todas maneras siempre se realiza el proceso de limpieza, para garantizar una base en óptimas condiciones.

## VIII. DIMENSIONES A EVALUAR

A través del cuestionario se obtuvo información relevante sobre las siguientes dimensiones:

1- Condición socioeconómica
2- Participación en grupos de apoyo
3- Participación en actividades de incidencia política
4- Perspectiva de futuro
5- Salud reproductiva
6- Conocimientos sobre VIH
7- Acceso a condones y lubricantes
8- Situación general de salud
9- Acceso a servicios de salud
10- Discriminación y estigma
11- Conducta sexual

## IX. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para cada pregunta o ítem del cuestionario se efectuó un análisis de frecuencias, si la variable era discreta y análisis de distribución si la misma era continua.

Por otra parte, interesó resumir la información mediante el desarrollo de índices o indicadores que combinaran diferentes preguntas. La combinación se realizó mediante la suma de las respuestas a las preguntas combinadas, previa transformación de éstas a una misma escala. El resultado de la suma se transformó a su vez a una escala que variara de 0 y 100 para facilitar su interpretación. En cada caso se mostró el mínimo, el máximo, el promedio y la desviación estándar resultante del índice correspondiente.

Estos índices se cruzaron también según diferentes variables de control y se analizó el correspondiente nivel de significancia con la distribución t de Student o F de Fisher,

dependiendo del tipo de variable de control. Siempre se utilizó como nivel de error máximo un $\alpha < 0.05$.

Para facilitar su interpretación, en todos los casos, además de la variable continua se creó una segunda variable que recodifica el indicador en las siguientes cuatro categorías:

- Muy baja (de 0 a 25)
- Media baja (de más de 25 a 50)
- Media alta (de más de 50 a 75)
- Muy alta (de más de 75 a 100)

Se trabajaron los siguientes indicadores para todo el cuestionario:

- Condición socioeconómica
- Disposición a participar en actividades de incidencia política
- Perspectiva de futuro
- Conocimientos sobre el VIH
- Acceso a condón
- Acceso a lubricante
- Acceso a servicios de salud de calidad
- Actitud hacia los medicamentos antirretrovirales
- Nivel de victimización
- Riesgo en relaciones sexuales
- Uso del condón
- Uso del lubricante

Cada uno de estos indicadores, así como algunas preguntas clave del cuestionario, fueron cruzados por las siguientes variables de control:

- Categorías de edad
- Identidad de género
- Nivel educativo
- Condición de migración
- Condición de actividad
- Ocupación principal
- Relación laboral
- Orientación sexual
- Tiempo transcurrido desde que recibió el diagnóstico de VIH
- Percepción del estado de salud
- Si tiene pareja estable

Para cada indicador y para cada variable de control se compararon los promedios correspondientes, utilizando la distribución t de Student o la F de Fisher, según el número de categorías de la variable de control.

Por otra parte, para cada pregunta clave del cuestionario también se realizaron los cruces pertinentes por cada variable de control. En este caso, puesto que las categorías de respuesta se distribuyen como una variable discreta, el análisis estadístico de asociación se realizó mediante la distribución $\chi^2$.

## X. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

En Guatemala se trabajó con un total de 459 Personas con VIH, distribuidas en todo el territorio nacional.




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala,REDCA+

La mayoría de las personas entrevistadas se concentra en edades comprendidas entre los 26 y los 45 años, con proporciones bastante menores para las personas más jóvenes o para aquellas con más de 60 años (ver cuadro # 1 y gráfico #1).

En lo que respecta a la identidad de género, un 42,9% de las personas entrevistadas se identifican como del género femenino y un 52,7% del masculino; mientras que solamente 20 personas se identificaron como trans, 13 como trans femeninas y 7 como trans masculina (ver cuadro # 2).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala,REDCA+

En cuanto al nivel de estudios, un 28% de las personas entrevistadas (32,1%) tienen apenas primaria incompleta, mientras que un 2% ha cursado estudios universitarios completos y existe un 1.5% que no asistió nunca a la educación formal (ver cuadro # 3).

Cerca de la mitad de las personas entrevistadas vive con su familia (49%), mientras que un 35,7% vive solo con su pareja y proporciones muy pequeñas señalan otras formas diferentes de convivencia (ver cuadro # 4 y gráfico #4). Por otra parte, la mitad de las personas dice tener actualmente una pareja estable (ver cuadro #5).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala,REDCA+

En otro orden de cosas, un 23,1% de las personas entrevistadas afirma haber cambiado de domicilio después de recibir su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 6). Entre las personas que han modificado su domicilio, existe un 11,3% que afirma haberlo hecho por persecución o discriminación por su condición de Persona con VIH (ver cuadro # 7). Sin embargo, la gran mayoría de las personas entrevistadas (87,7%) afirma no haber tenido ningún tipo de problema con el cambio de domicilio (ver cuadro #9). Entre las 9 personas que sí afirman haber tenido problemas de acceso a los medicamentos antirretrovirales, solo tres recuerdan cuál medicamento específico tomaba antes de migrar, mencionando una de ellas Efavirenz, otra Lamivudina y otra Zidovudina (ver cuadro #10).

**Cuadro # 1**
**EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 10,2 |
| De 26 a 35 | 141 | 30,7 |
| De 36 a 45 | 152 | 33,1 |
| De 46 a 60 | 96 | 20,9 |
| Más de 60 | 23 | 5,0 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 2
## IDENTIDAD DE GÉNERO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Femenino | 197 | 42,9 |
| Masculino | 242 | 52,7 |
| Mujer trans | 13 | 2,8 |
| Hombre trans | 7 | 1,5 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 3
## QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 1,5 |
| Alfabetizada | 6 | 1,5 |
| Primaria incompleta | 112 | 28,0 |
| Primaria completa | 73 | 18,3 |
| Secundaria incompleta | 53 | 13,3 |
| Secundaria completa | 108 | 27,0 |
| Universitaria incompleta | 33 | 8,3 |
| Universitaria completa | 8 | 2,0 |
| Post grado universitario | 1 | ,3 |
| Total | 400 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No sabe leer ni escribir | | 59 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 4
## CON QUIÉN VIVE
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Vive con su pareja | 164 | 35,7 |
| Vive con la familia de su pareja | 51 | 11,1 |
| Vive con su familia | 225 | 49,0 |
| Vive solo/a | 54 | 11,8 |
| Vive con amiga/o | 10 | 2,2 |
| Otro | 29 | 6,3 |
| Total | 533 | 116,1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 5
## ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 233 | 50,9 |
| No | 225 | 49,1 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 6
## HA CAMBIADO DE LUGAR DE DOMICILIO DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 106 | 23,1 |
| No | 352 | 76,9 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 7
## EL CAMBIO FUE DENTRO O FUERA DE SU PAÍS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Dentro del mismo país | 102 | 96,2 |
| A otro país | 4 | 3,8 |
| Total | 106 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha cambiado | | 353 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 8
## PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUAL CAMBIÓ DE DOMICILIO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Búsqueda de trabajo | 23 | 21,7 |
| Por razones de trabajo | 21 | 19,8 |
| Persecución o discriminación por su condición de persona con VIH | 12 | 11,3 |
| Mejorar vivienda | 23 | 21,7 |
| Mejorar situación económica | 6 | 5,7 |
| Mejorar situación familiar | 13 | 12,3 |
| Otra/ Especifique | 8 | 7,5 |
| Total | 106 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha cambiado | | 353 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 9
## PROBLEMAS AL CAMBIAR DE DOMICILIO
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acceso a tratamiento antirretroviral | 9 | 8,5 |
| Acceso a condones | 3 | 2,8 |
| Acceso a lubricantes | 3 | 2,8 |
| Acceso a servicios de salud | 9 | 8,5 |
| Ningún problema | 93 | 87,7 |
| Total | 117 | 110,4 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 10
## PROBLEMAS DE ACCESO A MEDICAMENTOS
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Efavirenz | 1 | 100,0 |
| Lamivudina | 1 | 100,0 |
| Zidovudina | 1 | 100,0 |
| Total | 3 | 300,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los individuos entrevistados fueron informados sobre la encuesta y su propósito y se les pidió su consentimiento informado. El mismo se hizo a nivel verbal para garantizar el anonimato y la confidencialidad de la información suministrada. Todos los datos que proporcionó la persona encuestada fueron totalmente confidenciales y fueron utilizados sin registrar el nombre de las personas o cualquier otro tipo de identificación personal. El cuestionario fue anónimo y cada boleta se identificó únicamente por un número consecutivo por país.

La participación en el estudio no implicó ningún riesgo para la salud de los participantes y de ninguna manera estuvo condicionada con los apoyos recibidos por parte del programa, grupo de autoayuda, o centro de salud. La participación en la encuesta quedó a decisión, libre y voluntaria, del participante y se obtuvo el consentimiento informado antes de proceder.

Solo se entrevistaron personas mayores de edad, por lo que no fue necesario un formulario de asentimiento.

La confidencialidad de la condición de persona viviendo con VIH es de enorme importancia y se encuentra prevista en el aparato jurídico de cada país. El respeto absoluto a esta confidencialidad es fundamental para reducir el estigma y la discriminación. Es por esta razón que el cuestionario fue anónimo y por la misma razón no se solicitó la firma del consentimiento informado, solo se solicitó el consentimiento verbal para aceptar la entrevista.

En este estudio no se realizaron tomas de muestras de biomarcadores por lo que no hubo toma de muestras de ningún fluido o excreta corporal. No se ofertó prueba rápida de detección de VIH ya que el estudio está dirigido a personas que son seropositivas.

El texto del consentimiento es el siguiente:

Buenos días (tardes).

[*organización correspondiente en cada país*] en coordinación con el Programa Regional REDCA+ está realizando un estudio titulado "Elaboración de Perfil de Riesgo de Personas con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+" cuyo objetivo es identificar los riesgos que asumen las personas con VIH y que podrían afectar su salud.

Los resultados de este estudio permitirán identificar y desarrollar estrategias que faciliten cambios de comportamientos y hábitos en las personas con VIH.

Usted ha sido seleccionado/a al azar para responder el presente cuestionario.

El instrumento es totalmente anónimo, es decir, no se le solicitará ni su nombre ni ningún otro dato que pueda identificarlo/a.

Específicamente se le plantearán preguntas acerca de sus características sociodemográficas, la participación en grupos de autoayuda, sus prácticas sexuales, las condiciones de su salud, la experiencia de estigma y discriminación y el consumo de alcohol y otras drogas.

Usted está en libertad de aceptar o no la entrevista, así como de contestar o no a cada una de las preguntas que se le hagan y puede interrumpirla en cualquier momento si así lo desea; sin que esto tenga ninguna repercusión para usted o para ser atendido en los servicios de salud o cualquier otro servicio público. De aceptar, se le garantiza la absoluta confidencialidad de la información proporcionada.

La entrevista tiene una duración aproximada de una hora.

Aunque no existe un beneficio directo para usted por responder la entrevista, tome en cuenta que la información brindada servirá para mejorar estrategias de apoyo a las personas con VIH.

Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificada individualmente ninguna de las personas entrevistadas.

Por favor indíqueme de manera verbal si desea o no participar en este estudio.

¿Desea participar? 1- ( ) Sí 2- ( ) No → **FIN DE ENTREVISTA**

El presente protocolo se presentó al Comité de Ética correspondiente de cada uno de los 7 países de la Región, para su evaluación y su respectiva aprobación y registro.

# LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Como ya se ha mencionado en el procedimiento metodológico, no existe un marco muestral de la población por país de personas con VIH y no puede establecerse en forma precisa, puesto que existen muchas exclusiones sistemáticas debido a múltiples factores, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

- Personas con VIH que nunca se han hecho el examen o que no conocen el resultado
- Personas con VIH que conocen su diagnóstico pero que no asisten a los centros de salud especializados en su atención
- Personas con VIH que conocen su diagnóstico pero que asisten de manera muy asistemática a los centros de salud

En todos estos casos es esperable que no exista adherencia al tratamiento o que la misma sea muy deficiente.

Por lo tanto, cualquier valoración que se establezca con una muestra de personas que asisten a los centros de salud visitados resultará necesariamente en una sobrevaloración de la proporción de adherencia en cada país. De ahí la importancia de insistir en la definición precisa de la población que se ha establecido en este protocolo antes de pretender cualquier tipo de generalización por país o a nivel regional.

Además de la importante limitación descrita hasta aquí, debe también mencionarse el sesgo que pueda implicar el nivel de rechazo a realizar la entrevista, puesto que podría estar excluyendo sistemáticamente a personas con VIH con alguna característica especial que le hace rechazar la entrevista, como por ejemplo el deseo de permanecer absolutamente en el anonimato, por más que se le garantice el mismo en el proceso de entrevista.

# RESULTADOS

# CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA

## I. ÍNDICE DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA

Para estimar la condición económica y social en la que vive la persona entrevistada, se combinaron las preguntas relacionadas con nivel educativo, ocupación, percepción de su condición económica y el número de dependientes.




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El indicador resultante muestra un promedio de apenas 40, en una escala de 0 a 100, por lo que debe concluirse que la condición socioeconómica de las personas entrevistadas tiende a ser bastante limitada. Por otra parte, la desviación estándar resulta relativamente baja, lo cual permite concluir que esta condición limitada tiende a variar poco entre las diferentes personas entrevistadas (ver cuadro # 11). De hecho, en el cuadro 12 o el gráfico 4, puede observarse que cerca de dos terceras partes de la muestra se ubican en la categoría medio baja.

## II. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Específicamente, se observa que cerca de la mitad de las personas afirman no estar trabajando al momento de la entrevista y un 21,8% se considera desempleado (ver cuadro #13). Entre aquellos que sí trabajan, casi la mitad lo hace en puestos no calificados (ver cuadro #14) y un 44,6% dice trabajar por cuenta propia, en gran medida en comercio, lo cual sugiere una proporción importante laborando en el sector informal (ver cuadro #15).

Por otra parte, entre las personas que trabajaban en el momento de la entrevista, cerca de tres cuartas partes (74%) afirman que su ingreso les permite cubrir poco sus necesidades básicas (ver cuadro #16). En este mismo sentido, más de la mitad (57,6%) afirma que apenas se las arregla para sobrevivir (ver cuadro #17).

Entre las personas que trabajan, un 71,9% tiene de 2 a 5 personas que dependen económicamente de ellas (ver cuadro #18) y el 74,4% afirma que sus ingresos le permiten poco cubrir las necesidades de sus dependientes (ver cuadro #19).

**Cuadro # 11**
**CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA**
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 16,67 | 92,20 | 39,9663 | 14,87202 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 12**
**CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy baja | 67 | 14,6 |
| Medio baja | 300 | 65,4 |
| Medio alta | 77 | 16,8 |
| Muy alta | 15 | 3,3 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 13
## A QUÉ SE DEDICA USTED

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 46,7 |
| Estudia y trabaja | 17 | 3,7 |
| Está desempleado | 100 | 21,8 |
| Es pensionado | 8 | 1,7 |
| Recibe Remesas | 9 | 2,0 |
| Solo estudia | 9 | 2,0 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 21,0 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 1,1 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 14
## OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Profesional | 11 | 4,8 |
| Técnico medio | 33 | 14,3 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 17,7 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 10,8 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 5,6 |
| No calificadas | 108 | 46,8 |
| Total | 231 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No trabaja | | 228 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 15
## RELACIÓN LABORAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 5,2 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 1,7 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 4,8 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 27,3 |
| Servicio doméstico | 15 | 6,5 |
| Cuenta propia | 103 | 44,6 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 6,9 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 3,0 |
| Total | 231 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No trabaja | | 228 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 16
## EL INGRESO LE PERMITE CUBRIR NECESIDADES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Mucho | 52 | 22,5 |
| Poco | 171 | 74,0 |
| Nada | 8 | 3,5 |
| Total | 231 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No trabaja | | 228 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 17
## CÓMO CALIFICARÍA USTED SU SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Relativamente buena | 45 | 19,5 |
| Se las arregla | 133 | 57,6 |
| Tiene algunas limitaciones | 36 | 15,6 |
| Tiene muchas limitaciones | 8 | 3,5 |
| Tiene serios problemas económicos | 9 | 3,9 |
| Total | 231 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No trabaja | | 228 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 18
## CUÁNTAS PERSONAS DEPENDENECONÓMICAMENTE DE USTED

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Ninguno | 12 | 5,2 |
| Uno | 45 | 19,5 |
| De 2 a 5 | 166 | 71,9 |
| Más de 5 | 8 | 3,5 |
| Total | 231 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No trabaja | | 228 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 19
## INGRESO LE PERMITE CUBRIR NECESIDADES DE DEPENDIENTES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Mucho | 49 | 21,6 |
| Poco | 169 | 74,4 |
| Nada | 9 | 4,0 |
| Total | 227 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 4 |
| No trabaja | | 228 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# PARTICIPACIÓN

## I. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE APOYO




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

Solamente un 24,5% de la muestra afirma asistir a grupos de apoyo para Personas con VIH (ver cuadro # 20 y gráfico #5). De estas personas, un 38,4%) lo hacen en un centro de salud, un 48,2% en una ONG y un 13,4% en un local independiente (ver cuadro #21).

La participación en actividades de prevención aumenta un poco, llegando al 49,9% de la muestra (ver cuadro #22). Pero solo un 21,5% reconoce participar en algún otro grupo relacionado con el VIH (ver cuadro #23).

Por otra parte, ante la pregunta sobre cómo podría contribuir a controlar la epidemia, llama la atención que las contribuciones se concentran de manera significativa en estrategias personales, tales como usar el condón o tomar los medicamentos, mientras las contribuciones más de tipo social, como participación en actividades o en una ONG, muestran niveles bastante bajos (ver cuadro #24).

## Cuadro # 20
## ASISTE A GRUPO DE APOYO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 112 | 24,5 |
| No | 346 | 75,5 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 21
## DÓNDE SE REÚNEN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| En el centro de salud | 43 | 38,4 |
| En una ONG | 54 | 48,2 |
| En un local independiente | 15 | 13,4 |
| Total | 112 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No asiste a grupos | | 347 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 22
## HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE PREVENVIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 229 | 49,9 |
| No | 230 | 50,1 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 23
## PARTICIPA EN ALGÚN OTRO GRUPO VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 98 | 21,5 |
| No | 358 | 78,5 |
| Total | 456 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 3 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 24
## CÓMO CONTRIBUIR A CONTROLAR EPIDEMIA
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Usando condón en todas mis relaciones sexuales | 418 | 91,5 |
| Tomando mis medicamentos sin interrupción | 369 | 80,7 |
| Cuidando mi salud | 310 | 67,8 |
| Siendo fiel o teniendo una sola pareja | 281 | 61,5 |
| Participando en actividades para mejorar la calidad de vida | 159 | 34,8 |
| Participando activamente en alguna ONG | 103 | 22,5 |
| No teniendo sexo | 76 | 16,6 |
| No hay nada que yo pueda hacer | 5 | 1,1 |
| Otra | 12 | 2,6 |
| Total | 1733 | 379,2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## II. PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA

La percepción que se tiene sobre la efectividad de diversos tipos de actividades de incidencia política tiende a ser apenas moderada, con un promedio de 57,7 y una desviación estándar de 23, en una escala de 0 a 100 (ver cuadro # 25).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

Concretamente, casi un 40% de las personas alcanzan niveles moderadamente bajos, pero que un 54,9% percibe alta o muy alta efectividad en las actividades (ver cuadro # 26 y gráfico #6).

La percepción resulta significativamente mejor entre las personas que solo estudian (ver cuadro #31).

Pero no presenta diferencias significativas según edad (ver cuadro #27), identidad de género (ver cuadro #28), nivel de estudios (ver cuadro #29), condición de migración (ver cuadro #30), ocupación (ver cuadro #32), relación laboral (ver cuadro #33), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #34), actividad sexual entre los hombres (ver cuadro #35), actividad sexual entre trans (ver cuadro #36), tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #37), percepción del estado de salud (ver cuadro #38) y si tiene pareja estable (ver cuadro #39).

Al evaluar la efectividad percibida de cada una de las actividades, se observa que las que son consideradas como más efectivas son la ayuda en una campaña, la denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y el reenviar un correo o mensaje. Mientras que las

tres actividades menos efectivas son la asistencia a reuniones de la Municipalidad o el Congreso, el llamar a los medios de comunicación y el ayudar a bloquear carreteras (ver cuadro #40).

Por otra parte, el nivel de participación en el pasado en este tipo de actividades resulta moderado o bajo. Más de un 60% dice haber asistido a una reunión de personas con VIH o haber portado un botón o insignia; mientras que menos de la quinta parte ha ayudado a bloquear carreteras o ha presentado un recurso en un juzgado (ver cuadro #41).

**Cuadro # 25**
**PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA**
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | ,00 | 100,00 | 57,6504 | 22,95972 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 26**
**PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy mala | 32 | 7,0 |
| Medio mala | 175 | 38,1 |
| Medio buena | 136 | 29,6 |
| Muy buena | 116 | 25,3 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 27**

## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 54,2553 | 20,22885 |
| De 26 a 35 | 141 | 58,1288 | 23,64275 |
| De 36 a 45 | 152 | 55,9211 | 21,72055 |
| De 46 a 60 | 96 | 58,7340 | 24,91017 |
| Más de 60 | 23 | 68,5619 | 21,62234 |
| Total | 459 | 57,6504 | 22,95972 |

F = 1,854 α = ,118

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 28
## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 197 | 58,8442 | 23,09544 |
| Masculino | 242 | 56,0394 | 22,70055 |
| Mujer trans | 13 | 65,6805 | 25,43805 |
| Hombre trans | 7 | 64,8352 | 21,69228 |
| Total | 459 | 57,6504 | 22,95972 |

F = 1,336 α = ,262

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 29

## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 44,8718 | 26,60990 |
| Alfabetizada | 6 | 65,3846 | 14,79645 |
| Primaria incompleta | 112 | 60,1648 | 24,83410 |
| Primaria completa | 73 | 56,2171 | 19,62868 |
| Secundaria incompleta | 53 | 55,8055 | 25,63067 |
| Secundaria completa | 108 | 60,3276 | 20,90583 |
| Universitaria incompleta | 33 | 54,7786 | 23,76830 |
| Universitaria completa | 8 | 50,0000 | 24,58446 |
| Post grado universitario | 1 | 7,6923 | , |
| Total | 400 | 57,9808 | 22,96399 |

F = 1,519 α = ,148

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 30
## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 102 | 57,3529 | 21,97218 |
| Migró a otro país | 4 | 64,4231 | 32,38924 |
| No migró | 353 | 57,6596 | 23,19225 |
| Total | 459 | 57,6504 | 22,95972 |

F = ,182 α = ,834

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 31

## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 55,1941 | 22,60059 |
| Estudia y trabaja | 17 | 44,3439 | 27,13235 |
| Está desempleado | 100 | 62,7308 | 22,08226 |
| Es pensionado | 8 | 49,0385 | 19,58466 |
| Recibe Remesas | 9 | 51,7094 | 22,01995 |
| Solo estudia | 9 | 64,1026 | 18,04006 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 61,4583 | 23,39177 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 53,0769 | 11,97878 |
| Total | 458 | 57,7259 | 22,92773 |

F = 2,694 α = ,010

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 32
## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 47,2028 | 25,04971 |
| Técnico medio | 33 | 54,0793 | 23,05567 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 57,5047 | 21,73930 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 43,0769 | 22,53640 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 51,4793 | 20,74420 |
| No calificadas | 108 | 57,0157 | 23,25494 |
| Total | 231 | 54,3956 | 23,07175 |

F = 1,925 α = ,091

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 33

## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 66,0256 | 25,07832 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 44,2308 | 25,99120 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 68,5315 | 17,35619 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 53,0525 | 20,88606 |
| Servicio doméstico | 15 | 49,2308 | 19,51439 |
| Cuenta propia | 103 | 53,2487 | 24,49014 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 55,2885 | 26,97340 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 56,0440 | 13,48115 |
| Total | 231 | 54,3956 | 23,07175 |

F = 1,333 α = ,236

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 34
## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 58,2418 | 23,12802 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 38,4615 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 73,0769 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 42,3077 | 5,43928 |
| Total | 116 | 57,9244 | 22,93877 |

F = ,696 α = ,556

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 35

## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 59,4017 | 23,30373 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 61,9658 | 23,66592 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 56,0440 | 21,39802 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 46,9231 | 15,14775 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 111 | 58,1081 | 23,76227 |
| Total | 173 | 57,8479 | 23,11177 |

F = ,680 α = ,607

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 36
## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 63,7019 | 22,11538 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 73,0769 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 92,3077 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 26,9231 | , |
| Total | 19 | 63,7652 | 23,08817 |

F = 1,539 α = ,245

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 37
## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 49,0385 | 34,73980 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 53,1674 | 24,33415 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 53,0769 | 22,82590 |
| De 1 o 2 años | 71 | 57,8007 | 22,15152 |
| De 3 a 5 años | 103 | 57,8790 | 23,62582 |
| De 6 a 10 años | 118 | 58,1486 | 21,69410 |
| Más de 10 años | 123 | 58,7242 | 23,91335 |
| No recuerda | 3 | 50,0000 | 21,41448 |
| Total | 459 | 57,6504 | 22,95972 |

F = ,379 α = ,915

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 38
## PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 59,2792 | 23,10097 |
| Bueno | 183 | 55,5485 | 22,66673 |
| Estable | 105 | 58,4982 | 23,35079 |
| Malo | 23 | 61,0368 | 23,23096 |
| Muy Malo | 4 | 63,4615 | 11,95818 |
| Total | 458 | 57,7343 | 22,91430 |

F = ,788 α = ,533

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 39**

**PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA**
**SEGÚN ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE**

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 57,4612 | 22,54464 |
| No | 225 | 57,8803 | 23,47480 |

t = -,195 α = ,846

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 40**
**EFECTIVIDAD PERCIBIDA PARA CADA ACTIVIDAD DE INCIDENCIA POLÍTICA**

| | Muy Efectiva | Algo Efectiva | Nada Efectiva | No sabe |
|---|---|---|---|---|
| Ayudar en una campaña para mejorar las condiciones de las personas con VIH. | 48,1 | 32,2 | 8,5 | 11,1 |
| Denunciar ante la Procuraduría de los Derechos Humanos una situación de discriminación por ser una persona con VIH. | 47,3 | 22,7 | 15,0 | 15,0 |
| Reenviar un correo o mensaje que defiende derechos de las personas con VIH. | 42,3 | 20,9 | 23,5 | 13,3 |
| Participar en manifestaciones o marchas de protesta. | 38,3 | 28,8 | 22,7 | 10,2 |
| Participar en una reunión con alguna autoridad del Gobierno. | 37,9 | 26,1 | 14,4 | 21,6 |
| Firmar una carta planteando un problema de las personas con VIH. | 37,9 | 28,8 | 14,2 | 19,2 |
| Portar una insignia, botón o camiseta por una causa de las personas con VIH. | 35,3 | 29,0 | 22,7 | 13,1 |
| Presentar un recurso ante los juzgados ante una situación de discriminación por ser una persona con VIH. | 34,2 | 24,0 | 16,8 | 25,1 |
| Escribir o exponer públicamente su posición ante un problema de las personas con VIH. | 29,0 | 20,5 | 19,8 | 30,7 |
| Asistir a una reunión de personas con VIH para discutir sobre problemas comunes. | 28,5 | 26,6 | 21,6 | 23,3 |
| Asistir a reuniones de la Municipalidad o del Congreso. | 28,1 | 20,9 | 28,8 | 22,2 |
| Llamar a los medios de comunicación para quejarse. | 27,2 | 27,9 | 22,9 | 22,0 |
| Ayudar a bloquear carreteras en una protesta. | 27,0 | 22,2 | 31,6 | 19,2 |
| Total | 507 | 100,0 | | |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 41
## ACTIVIDADES DE INCIDENCIA EN LAS QUE HA PARTICIPADO
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Asistir a una reunión de personas con VIH para discutir sobre problemas comunes. | 165 | 69,3 |
| Portar una insignia, botón o camiseta por una causa de las personas con VIH. | 146 | 61,3 |
| Ayudar en una campaña para mejorar las condiciones de las personas con VIH. | 109 | 45,8 |
| Participar en manifestaciones o marchas de protesta | 98 | 41,2 |
| Firmar una carta planteando un problema de las personas con VIH. | 80 | 33,6 |
| Escribir o exponer públicamente su posición ante un problema de las personas con VIH. | 39 | 31,5 |
| Reenviar un correo o mensaje que defiende derechos de las personas con VIH. | 75 | 29,4 |
| Participar en una reunión con alguna autoridad del Gobierno. | 88 | 28,6 |
| Llamar a los medios de comunicación para quejarse. | 65 | 27,3 |
| Denunciar ante la Procuraduría de los Derechos Humanos una situación de discriminación por ser una persona con VIH. | 59 | 24,8 |
| Asistir a reuniones de la Municipalidad o del Congreso. | 48 | 20,2 |
| Ayudar a bloquear carreteras en una protesta. | 39 | 16,4 |
| Presentar un recurso ante los juzgados ante una situación de discriminación por ser una persona con VIH. | 39 | 16,4 |
| Total | 1061 | 445,8 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# PERSPECTIVA DE FUTURO

El nivel de optimismo con que las personas entrevistadas perciben su futuro tiende a ser muy positivo, con un promedio de 88,4 en una escala de 0 a 100 y con una variabilidad relativamente baja, con una desviación estándar de 24,6 (ver cuadro #42).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

De hecho, cerca de cuatro quintas partes de las personas entrevistadas muestran un nivel muy alto en este indicador (ver cuadro # 43 y gráfico #7).

La perspectiva tiende a ser superior entre las personas de 26 a 45 años (ver cuadro #44), entre las que se identifican con el género masculino (ver cuadro #45) y conforme aumenta el nivel educativo (ver cuadro #46), las personas que laboran en una ONG o en la empresa privada (ver cuadro #50), las personas con menor tiempo de haber recibido su diagnóstico (ver cuadro #54) y entre las personas que mejor perciben su estado de salud actual (ver cuadro #55).

La perspectiva no varía según la condición de migración (ver cuadro #47), nivel de actividad (ver cuadro #46), la ocupación (ver cuadro #49, actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #51), de los hombres (ver cuadro #52) y de las personas trans (ver cuadro #53), y si tiene pareja estable (ver cuadro #56).

El análisis de cada uno de los ítemes de esta escala muestra que 85,8% afirma tener planes definidos para su futuro (ver cuadro #57), el 90,4% considera que está haciendo algo importante para cambiar su futuro (ver cuadro #58) y el 83,4% considera que su futuro será mejor (ver cuadro #59).

**Cuadro # 42**
**PERSPECTIVA DE FUTURO**
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 457 | ,00 | 100,00 | 88,3662 | 24,59873 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 43**
**PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy mala | 23 | 5,0 |
| Medio mala | 26 | 5,7 |
| Medio buena | 44 | 9,6 |
| Muy buena | 364 | 79,6 |
| Total | 457 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| Sistema | | 2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 44
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 86,8794 | 28,27278 |
| De 26 a 35 | 141 | 89,8345 | 24,48056 |
| De 36 a 45 | 152 | 91,9956 | 18,29470 |
| De 46 a 60 | 94 | 84,9291 | 27,46989 |
| Más de 60 | 23 | 72,4638 | 33,84408 |
| Total | 457 | 88,3662 | 24,59873 |

F = 3,958 α = ,004

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 45
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 196 | 85,2041 | 26,72884 |
| Masculino | 241 | 91,5284 | 21,32702 |
| Mujer trans | 13 | 80,1282 | 33,77116 |
| Hombre trans | 7 | 83,3333 | 37,26780 |
| Total | 457 | 88,3662 | 24,59873 |

F = 3,031 α = ,029

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 46
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 65,2778 | 37,42276 |
| Alfabetizada | 6 | 95,8333 | 10,20621 |
| Primaria incompleta | 112 | 81,2500 | 29,39369 |
| Primaria completa | 72 | 89,6991 | 23,54918 |
| Secundaria incompleta | 53 | 93,5535 | 21,09714 |
| Secundaria completa | 108 | 92,0525 | 21,41734 |
| Universitaria incompleta | 33 | 98,9899 | 5,80259 |
| Universitaria completa | 8 | 93,7500 | 12,40040 |
| Post grado universitario | 1 | 100,0000 | , |
| Total | 399 | 89,0769 | 24,21097 |

F = 3,618 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 47
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 101 | 86,5512 | 26,19294 |
| Migró a otro país | 4 | 79,1667 | 14,43376 |
| No migró | 352 | 88,9915 | 24,21906 |
| Total | 457 | 88,3662 | 24,59873 |

F = ,667 α = ,514

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 48
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 88,7072 | 24,01563 |
| Estudia y trabaja | 17 | 85,2941 | 30,97510 |
| Está desempleado | 100 | 94,0833 | 13,04481 |
| Es pensionado | 7 | 88,0952 | 31,49704 |
| Recibe Remesas | 9 | 83,3333 | 33,07189 |
| Solo estudia | 9 | 87,0370 | 30,65011 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 83,8542 | 29,58812 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 4 | 77,0833 | 45,83333 |
| Total | 456 | 88,4868 | 24,48993 |

F = 1,477 α = ,173

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 49
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 92,4242 | 13,66999 |
| Técnico medio | 33 | 91,1616 | 24,46825 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 91,4634 | 21,28574 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 88,6667 | 24,87003 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 87,1795 | 26,48711 |
| No calificadas | 108 | 86,1883 | 26,40551 |
| Total | 231 | 88,4560 | 24,52883 |

F = ,448 α = ,815

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 50
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 80,5556 | 33,01617 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 87,5000 | 15,95712 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 98,4848 | 5,02519 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 96,8254 | 11,92011 |
| Servicio doméstico | 15 | 85,5556 | 27,36197 |
| Cuenta propia | 103 | 87,1359 | 26,06074 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 76,0417 | 31,45764 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 65,4762 | 39,21350 |
| Total | 231 | 88,4560 | 24,52883 |

F = 3,230 α = ,003

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 51
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 89,1369 | 22,22708 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 100,0000 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 100,0000 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 100,0000 | ,00000 |
| Total | 116 | 89,5115 | 21,92766 |

F = ,310 α = ,818

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 52
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 93,9815 | 18,64573 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 97,2222 | 8,33333 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 96,4286 | 9,44911 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 100,0000 | ,00000 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 110 | 93,7879 | 18,00570 |
| Total | 172 | 94,4767 | 16,93787 |

F = ,396 α = ,812

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 53
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PESONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 82,2917 | 32,32861 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 100,0000 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 100,0000 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 8,3333 | , |
| Total | 19 | 80,2632 | 34,71784 |

F = 1,920 α = ,170

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 54
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 95,8333 | 8,33333 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 78,9216 | 37,51361 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 97,5000 | 8,15601 |
| De 1 o 2 años | 71 | 95,6573 | 13,35260 |
| De 3 a 5 años | 102 | 90,7680 | 22,55378 |
| De 6 a 10 años | 118 | 90,8898 | 21,95316 |
| Más de 10 años | 122 | 80,0546 | 29,95170 |
| No recuerda | 3 | 55,5556 | 38,49002 |
| Total | 457 | 88,3662 | 24,59873 |

F = 5,061 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 55
## PERSPECTIVA DE FUTURO
## SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 90,2681 | 22,02542 |
| Bueno | 182 | 90,3388 | 22,60963 |
| Estable | 104 | 88,4615 | 24,25557 |
| Malo | 23 | 67,0290 | 37,89591 |
| Muy Malo | 4 | 52,0833 | 42,14997 |
| Total | 456 | 88,3772 | 24,62462 |

F = 7,387 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 56**
**PERSPECTIVA DE FUTURO**
## SEGÚN ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 90,3076 | 22,23585 |
| No | 223 | 86,7339 | 26,16089 |

t = 1,568 α = ,117

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 57
## TIENE PLANES DEFINIDOS PARA SU FUTURO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 393 | 85,8 |
| No | 65 | 14,2 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 58
## ESTÁ HACIENDO ALGO IMPORTANTE PARA CAMBIAR SU FUTURO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 413 | 90,4 |
| No | 44 | 9,6 |
| Total | 457 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 59**
**EN EL FUTURO USTED ESTARÁ MEJOR, PEOR O IGUAL QUE AHORA**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Mejor | 383 | 83,4 |
| Peor | 15 | 3,3 |
| Igual | 32 | 7,0 |
| No Sabe | 29 | 6,3 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# ACTIVIDAD SEXUAL

Solamente el 70,1% de las personas entrevistadas afirma haber tenido relaciones sexuales con penetración (ver cuadro #60).

Por otra parte, el 96,6% de las mujeres entrevistadas solo tiene relaciones sexuales con hombres, mientras que entre las personas que se identifican con el género masculino, la actividad sexual es más variable, aunque siempre la mayoría (64,2%) tiende a tener relaciones solo con mujeres. Entre las mujeres trans, el 76,9% solo tiene relaciones con hombres y los hombres trans solo tienen relaciones con hombres (ver cuadro #61).

**Cuadro # 60**
**HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 310 | 70,1 |
| No | 132 | 29,9 |
| Total | 442 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 17 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 61**
**ACTIVIDAD SEXUAL**
**SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO**

| | Femenino | Masculino | Mujer trans | Hombre trans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 96,6 | 20,8 | 76,9 | 100,0 | 53,2 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 0,9 | 5,2 | 7,7 | | 3,6 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | | 4,0 | 7,7 | | 2,6 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 0,9 | 5,8 | 7,7 | | 3,9 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 1,7 | 64,2 | | | 36,7 |

$\chi^2$ = 175,490 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# SALUD SEXUAL DE LOS HOMBRES

Solo un 9,1% de los hombres y de las mujeres trans afirma haber recibido explicaciones sobre cómo realizarse el autoexamen del testículo (ver cuadro #62). Entre los que sí han recibido explicación, la frecuencia con que practican este tipo de examen tiende a ser en general bastante baja (ver cuadro #63).

Por otra parte, solamente un 7,9% de este grupo de entrevistados afirma haberse realizado el examen para detectar el cáncer de testículo (ver cuadro #64) y la frecuencia con que lo realizan tiende a ser muy variable (ver cuadro #65).

En lo que respecta al examen de tacto rectal para el cáncer de próstata, de nuevo, solo un 5,6% se lo ha realizado (ver cuadro #66) y entre éstos, la mitad solo se lo ha hecho una vez (ver cuadro #67).

**Cuadro # 62**
**LE HAN EXPLICADO CÓMO REALIZAR EL AUTOEXAMEN DEL TESTÍCULO**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 23 | 9,1 |
| No | 219 | 86,9 |
| No sabe qué es | 10 | 4,0 |
| Total | 252 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 3 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 63**
**FRECUENCIA CON QUE SE REALIZA EL AUTOEXAMEN DEL TESTÍCULO**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Nunca | 2 | 8,7 |
| Cada vez que se baña | 7 | 30,4 |
| Una vez al mes | 4 | 17,4 |
| Cada dos o tres meses | 5 | 21,7 |
| De vez en cuando | 5 | 21,7 |
| Total | 23 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No conoce el examen | | 232 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 64
## LE HA REALIZADO EXAMEN PARA DETETAR CÁNCER DE TESTÍCULO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 20 | 7,9 |
| No | 222 | 87,7 |
| No sabe qué es | 11 | 4,3 |
| Total | 253 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 65
## FRECUENCIA CON QUE REALIZA EXAMEN PARA CÁNCER DE TESTÍCULO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Más de una vez al año | 2 | 10,0 |
| Cada año | 5 | 25,0 |
| Cada dos años | 2 | 10,0 |
| Cada tres años o más | 2 | 10,0 |
| Se lo ha hecho una sola vez | 9 | 45,0 |
| Total | 20 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| Nunca se ha hecho examen | | 235 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 66
## LE HA REALIZADO TACTO RECTAL PARA CÁNCER DE PRÓSTATA

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 14 | 5,6 |
| No | 226 | 90,0 |
| No Sabe qué es | 11 | 4,4 |
| Total | 251 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 4 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 67
## FRECUENCIA CON QUE REALIZA EXAMEN PARA CÁNCER DE PRÓSTATA

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Más de una vez al año | 3 | 21,4 |
| Cada año | 3 | 21,4 |
| Cada tres años o más | 1 | 7,1 |
| Se lo ha hecho una sola vez | 7 | 50,0 |
| Total | 14 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| Nunca se ha hecho examen | | 241 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# SALUD SEXUAL DE LAS MUJERES

En lo que respecta a la salud sexual de las mujeres, se observa que a menos de la mitad de ellas se le ha explicado cómo realizar el autoexamen de mama (ver cuadro #68), pero la frecuencia con que se realiza este examen tiende a ser muy variable (ver cuadro #69).

Por otra parte, menos de una tercera parte se ha realizado alguna vez una mamografía (ver cuadro #70) y la mitad de éstas realiza este examen cada uno o dos años (ver cuadro #71).

Contrario a las tendencias anteriores, el examen de Papanicolaou es practicado por el 83,7% de las mujeres entrevistadas (ver cuadro #72) y la gran mayoría se lo hace cada año (ver cuadro #73).

Solo un 19.2% de las mujeres entrevistadas ha estado embarazada después de saber el diagnóstico de VIH (ver cuadro #74). De éstas, un 51,4% no planificó dicho(s) embarazo(s) (ver cuadro #75).

A pesar de que el 76,3% afirma haber recibido información sobre el riesgo de transmisión del VIH de madre a hijo (ver cuadro #76), un 58,9% de las mujeres que han estado embrazadas tienen al menos un hijo con VIH (ver cuadro #77).

En lo que respecta a la planificación familiar, solo el 43,6% de las mujeres dicen utilizar algún método en el momento de la entrevista (ver cuadro #78) y sobresale, con mucho, el condón como el principal método que se usa (ver cuadro #79).

Entre las principales razones para no utilizar algún método anticonceptivo, se menciona con mayor frecuencia el no considerarlo necesario, por no tener relaciones sexuales o por no ser ya fértil (ver cuadro #80).

**Cuadro # 68**
**LE HA EXPLICADO CÓMO REALIZAR EL AUTOEXAMEN DE MAMA**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 93 | 46,0 |
| No | 97 | 48,0 |
| No sabe qué es | 12 | 5,9 |
| Total | 202 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 69
## FRECUENCIA CON QUE REALIZA EL AUTOEXAMEN DE MAMA

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Nunca | 6 | 6,5 |
| Cada vez que se baña | 22 | 23,9 |
| Una vez por semana | 7 | 7,6 |
| Una vez al mes | 12 | 13,0 |
| Cada dos o tres meses | 8 | 8,7 |
| Una vez por año | 15 | 16,3 |
| De vez en cuando | 22 | 23,9 |
| Total | 92 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No responde | | 1 |
| No le han explicado | | 111 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 70
## SE HA HECHO UNA MAMOGRAFÍA

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 63 | 31,0 |
| No | 129 | 63,5 |
| No Sabe qué es | 11 | 5,4 |
| Total | 203 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 71
## FRECUENCIA CON QUE HACE MAMOGRAFÍA

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Más de una vez al año | 7 | 11,1 |
| Cada año | 27 | 42,9 |
| Cada dos años | 3 | 4,8 |
| Cada tres años o más | 9 | 14,3 |
| Se lo ha hecho una sola vez | 17 | 27,0 |
| Total | 63 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No se ha hecho el examen | | 141 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 72
## SE HA HECHO EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 170 | 83,7 |
| No | 32 | 15,8 |
| No Sabe qué es | 1 | ,5 |
| Total | 203 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 73
## FRECUENCIA CON QUE REALIZA EL PAPANICOLAOU

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Más de una vez al año | 26 | 15,3 |
| Cada año | 114 | 67,1 |
| Cada dos años | 8 | 4,7 |
| Cada tres años o más | 12 | 7,1 |
| Se la ha hecho una sola vez | 10 | 5,9 |
| Total | 170 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No se ha hecho el examen | | 34 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 74
## HA ESTADO EMBARAZADA DESPUÉS DE SABER DIAGNÓSTICO POR VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 39 | 19,2 |
| No | 164 | 80,8 |
| Total | 203 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 75
## PLANIFICÓ USTED ESE(ESOS) EMBARAZO(S)

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Todas las veces | 14 | 37,8 |
| La mayoría de las veces | 1 | 2,7 |
| Pocas veces | 3 | 8,1 |
| Nunca | 19 | 51,4 |
| Total | 37 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 2 |
| No ha estado embarazada | | 165 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 76
## RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE RIESGO DE TRANSMISIÓN DE MADRE A HIJO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 29 | 76,3 |
| No | 9 | 23,7 |
| Total | 38 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |
| No ha estado embarazada | | 165 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 77
## CUÁNTOS HIJOS DESDE SU DIAGNÓSTICO SON PERSONAS VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 41,0 |
| 1 | 21 | 53,8 |
| 2 | 2 | 5,1 |
| Total | 39 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha estado embarazada | | 165 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 78
## UTILIZA ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 89 | 43,6 |
| No | 115 | 56,4 |
| Total | 204 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 79
## MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN UTILIZADOS
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas anticonceptivas | 6 | 6,8 |
| Métodos inyectables | 7 | 8,0 |
| Dispositivos intrauterinos | 7 | 8,0 |
| Condones o preservativos | 73 | 83,0 |
| Esterilización quirúrgica | 8 | 9,1 |
| Métodos naturales (Billings,temperatura o calendario) | 1 | 1,1 |
| Otro/Especifique | 1 | 1,1 |
| Total | 103 | 117,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 80
## POR QUÉ NO UTILIZA MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Se quiere embarazar | 3 | 3,0 |
| No sabe dónde conseguirlos | 2 | 2,0 |
| No lo considera necesario | 84 | 84,0 |
| Su pareja no quiere o se lo prohíbe | 2 | 2,0 |
| No le gustan | 3 | 3,0 |
| No contesta | 6 | 6,0 |
| Total | 100 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| Está esterilizada | | 15 |
| Sí utiliza | | 89 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH

El nivel de conocimientos sobre el VIH resulta positivo, con un promedio de 81,7 y una desviación estándar relativamente baja con un valor de 18,8 (ver cuadro #81).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

Ninguna persona muestra un nivel muy bajo de conocimientos y cerca de dos terceras partes muestran un nivel muy alto (ver cuadro # 82 y gráfico #8).

El nivel de conocimientos tiende a ser superior entre las personas más jóvenes (ver cuadro #83), aquellos que se identifican con el género masculino (ver cuadro #84), las de mayor nivel de estudios (ver cuadro #85), las que estudian y trabajan (ver cuadro #87), las que trabajan en una ONG (ver cuadro #89), los hombres que tienen sexo solo con hombres (ver cuadro #91) y quienes tienen mayor tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #93).

No existen diferencias significativas según condición de migración (ver cuadro #86), ocupación (ver cuadro #88), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #90) y entre trans (ver cuadro #92), percepción del estado de salud (ver cuadro #94) y si tiene pareja estable (ver cuadro #95).

Específicamente, se observa que la mayoría de las personas menciona que, para evitar la transmisión del VIH de madre a hijo, la mujer, deber ponerse en control médico y tomar sus medicamentos antirretrovirales (ver cuadro #96).

Del mismo modo, el 78,8% está consciente de que las personas con VIH pueden reinfectarse (ver cuadro #97) y el 92,9% está de acuerdo con que usando el condón de manera correcta se puede prevenir la reinfección (ver cuadro #98).

Un 40,6% considera que su riesgo de reinfectarse es medio o alto, mientras que un 42,2% considera que es bajo (ver cuadro #99).

Ante la pregunta sobre qué puede hacer una persona con VIH para prevenir la reinfección, el 92,1% menciona el uso del condón en toda relación sexual (ver cuadro #100).

**Cuadro # 81**
**CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA**
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 36,11 | 100,00 | 81,6933 | 18,76768 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 82**
**CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Medio bajos | 46 | 10,0 |
| Medio altos | 114 | 24,8 |
| Muy altos | 299 | 65,1 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 83
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 80,9102 | 20,65436 |
| De 26 a 35 | 141 | 80,5556 | 17,67767 |
| De 36 a 45 | 152 | 85,1974 | 17,56756 |
| De 46 a 60 | 96 | 80,7870 | 19,30260 |
| Más de 60 | 23 | 70,8937 | 22,47129 |
| Total | 459 | 81,6933 | 18,76768 |

F = 3,510 α = ,008

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 84
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 197 | 81,8528 | 17,63423 |
| Masculino | 242 | 82,5069 | 19,16380 |
| Mujer trans | 13 | 76,2821 | 22,47013 |
| Hombre trans | 7 | 59,1270 | 16,79842 |
| Total | 459 | 81,6933 | 18,76768 |

F = 3,966 α = ,008

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 85
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 73,6111 | 19,62220 |
| Alfabetizada | 6 | 81,4815 | 24,19485 |
| Primaria incompleta | 112 | 77,6290 | 20,13413 |
| Primaria completa | 73 | 83,7900 | 16,83947 |
| Secundaria incompleta | 53 | 85,8491 | 17,28950 |
| Secundaria completa | 108 | 87,8858 | 15,48446 |
| Universitaria incompleta | 33 | 89,3939 | 13,40214 |
| Universitaria completa | 8 | 94,4444 | 6,47203 |
| Post grado universitario | 1 | 91,6667 | , |
| Total | 400 | 83,9514 | 17,80178 |

F = 3,717 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 86
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 102 | 82,8704 | 19,52124 |
| Migró a otro país | 4 | 70,1389 | 24,36171 |
| No migró | 353 | 81,4841 | 18,49134 |
| Total | 459 | 81,6933 | 18,76768 |

F = ,981 α = ,376

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 87
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 82,8920 | 17,93815 |
| Estudia y trabaja | 17 | 90,5229 | 14,79864 |
| Está desempleado | 100 | 80,6111 | 20,68919 |
| Es pensionado | 8 | 74,3056 | 23,08590 |
| Recibe Remesas | 9 | 88,5802 | 19,71266 |
| Solo estudia | 9 | 76,5432 | 23,98041 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 80,1505 | 17,39621 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 58,3333 | 14,16394 |
| Total | 458 | 81,6715 | 18,78240 |

F = 2,403 α = ,020

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 88
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 90,9091 | 10,83625 |
| Técnico medio | 33 | 83,1650 | 16,52047 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 86,4499 | 17,02389 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 77,8889 | 19,21960 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 76,7094 | 22,26669 |
| No calificadas | 108 | 83,7449 | 17,90089 |
| Total | 231 | 83,4536 | 17,81055 |

F = 1,502 α = ,190

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 89
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 83,1019 | 18,55688 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 97,9167 | 1,38889 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 92,6768 | 10,41372 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 87,8307 | 14,50625 |
| Servicio doméstico | 15 | 85,5556 | 17,48015 |
| Cuenta propia | 103 | 79,9622 | 19,05401 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 78,4722 | 19,68110 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 80,1587 | 22,87404 |
| Total | 231 | 83,4536 | 17,81055 |

F = 2,231 α = ,033

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 90
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 86,0367 | 15,51967 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 97,2222 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 88,8889 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 97,2222 | ,00000 |
| Total | 116 | 86,3506 | 15,35310 |

F = ,520 α = ,670

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 91
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 92,4383 | 12,90330 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 77,1605 | 19,87508 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 85,7143 | 21,72053 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 88,6111 | 10,91258 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 111 | 82,9830 | 18,58911 |
| Total | 173 | 85,0835 | 17,72370 |

F = 2,582 α = ,039

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 92
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 69,9653 | 21,49789 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 86,1111 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 97,2222 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 36,1111 | , |
| Total | 19 | 70,4678 | 22,45653 |

F = 1,547 α = ,244

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 93
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 40,2778 | 4,81125 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 66,5033 | 22,83172 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 70,2778 | 20,47400 |
| De 1 o 2 años | 71 | 83,2942 | 17,93761 |
| De 3 a 5 años | 103 | 80,1241 | 19,98834 |
| De 6 a 10 años | 118 | 84,9341 | 15,87386 |
| Más de 10 años | 123 | 84,5980 | 16,72066 |
| No recuerda | 3 | 68,5185 | 26,97926 |
| Total | 459 | 81,6933 | 18,76768 |

F = 7,402 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 94
## CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA
## SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 82,4204 | 18,57776 |
| Bueno | 183 | 82,1797 | 17,90576 |
| Estable | 105 | 81,7989 | 19,43292 |
| Malo | 23 | 74,8792 | 22,05553 |
| Muy Malo | 4 | 81,2500 | 15,44521 |
| Total | 458 | 81,7928 | 18,66655 |

F = ,849 α = ,495

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 95**
**CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA**
## SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 83,2618 | 17,41022 |
| No | 225 | 80,2593 | 19,83508 |

t = 1,719 α = ,086

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 96
## QUÉ PUEDE HACER PARA EVITAR TRANSMISIÓN DE MADRE A HIJO
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ponerse en control médico | 359 | 79,1 |
| Tomar medicamento antirretrovirales | 333 | 73,3 |
| Pedir que le hagan cesárea | 358 | 78,9 |
| No amamantar al bebé | 341 | 75,1 |
| Otra/ Especifique | 15 | 3,3 |
| No sabe | 56 | 12,3 |
| Total | 1462 | 322,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 97
## PERSONA CON VIH PUEDA REINFECTARSE

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 353 | 78,8 |
| No | 26 | 5,8 |
| No Sabe qué es | 69 | 15,4 |
| Total | 448 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 11 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 98
## USANDO EL CONDÓN DE MANERA CORRECTA SE PUEDE PREVENIR LA REINFECCIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 326 | 92,9 |
| No | 21 | 6,0 |
| No Sabe qué es | 4 | 1,1 |
| Total | 351 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 2 |
| No cree en reinfección | | 106 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 99
## SU RIESGO DE RE-INFECTARSE POR VIH ES…

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Alto | 86 | 24,4 |
| Medio | 57 | 16,2 |
| Bajo | 149 | 42,3 |
| Ningún riesgo | 31 | 8,8 |
| No sabe | 29 | 8,2 |
| Total | 352 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 1 |
| No cree en reinfección | | 106 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 100
## QUÉ PUEDEN HACER LAS PERSONAS CON VIH PARA PREVENIR LA REINFECCIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Usar condón en toda relación sexual | 325 | 92,1 |
| No tener relaciones sexuales | 20 | 5,7 |
| No puede hacer nada | 2 | ,6 |
| Otra/ Especifique | 2 | ,6 |
| No sabe | 4 | 1,1 |
| Total | 353 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No cree en reinfección | | 106 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# ACCESO AL CONDÓN

El nivel de acceso al condón resulta muy bajo entre las personas entrevistadas. Este indicador muestra un promedio de apenas 29,8 en una escala de 0 a 100. (ver cuadro #101).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El 88,4% de las personas entrevistadas muestra un nivel de acceso a condones muy bajo o medio bajo (ver cuadro # 102y gráfico #9).

El acceso resulta superior según nivel de estudios, concentrándose el mayor acceso en los niveles superiores (ver cuadro #105) y resulta mejor entre las ocupaciones de nivel medio (ver cuadro #108). También existen mejores promedios entre los empleados de una ONG (ver cuadro #109) y entre los hombres que tiene sexo solo con hombres (ver cuadro #111).

El nivel de acceso no muestra diferencias significativas según edad (ver cuadro #103), condición de migración (ver cuadro #106), nivel de actividad (ver cuadro #107), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #110) y trans (ver cuadro #112), según el tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #113), la percepción del estado de salud (ver cuadro #114) y si tiene pareja estable (ver cuadro #115).

El 92,9% menciona el centro de salud como lugar para conseguir condones, mientras que la farmacia es mencionada por el 82,3% y el supermercado por solo el 58,3% (ver cuadro #116).

La mayoría de las personas entrevistadas afirma que la última vez que recibió condones gratis fue hace varios meses (ver cuadro #117) y cerca de la mitad (48,7%) dice haber recibido de dos a cuatro docenas (ver cuadro #118).

**Cuadro # 101**
**ACCESO AL CONDÓN**
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 396 | 4,98 | 84,13 | 29,8079 | 15,65838 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 102**
**ACCESO AL CONDÓN**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy bajo | 163 | 41,2 |
| Medio bajo | 187 | 47,2 |
| Medio alto | 44 | 11,1 |
| Muy alto | 2 | ,5 |
| Total | 396 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| Sistema | | 63 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 103**
**ACCESO AL CONDÓN**

## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 34 | 31,7810 | 14,75943 |
| De 26 a 35 | 127 | 29,9641 | 16,57864 |
| De 36 a 45 | 137 | 30,5946 | 15,58195 |
| De 46 a 60 | 81 | 28,9314 | 15,37045 |
| Más de 60 | 17 | 22,5313 | 10,96851 |
| Total | 396 | 29,8079 | 15,65838 |

F = 1,208 α = ,307

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 104
## ACCESO AL CONDÓN
## SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 159 | 27,8809 | 15,75710 |
| Masculino | 219 | 31,2256 | 15,51025 |
| Mujer trans | 12 | 29,1667 | 11,85194 |
| Hombre trans | 6 | 30,4127 | 22,76905 |
| Total | 396 | 29,8079 | 15,65838 |

F = 1,415 α = ,238

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 105
## ACCESO AL CONDÓN
## SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 3 | 28,0423 | 7,91803 |
| Alfabetizada | 5 | 32,5619 | 15,37697 |
| Primaria incompleta | 95 | 25,6187 | 16,17086 |
| Primaria completa | 68 | 29,2617 | 15,48395 |
| Secundaria incompleta | 50 | 33,7098 | 14,84512 |
| Secundaria completa | 100 | 32,0610 | 14,16282 |
| Universitaria incompleta | 29 | 34,5068 | 18,00154 |
| Universitaria completa | 8 | 40,0833 | 15,23076 |
| Post grado universitario | 1 | 43,5714 | , |
| Total | 359 | 30,4374 | 15,64310 |

F = 2,389 α = ,016

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 106
## ACCESO AL CONDÓN
## SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 91 | 29,5289 | 15,67288 |
| Migró a otro país | 2 | 22,0794 | 3,45697 |
| No migró | 303 | 29,9427 | 15,71650 |
| Total | 396 | 29,8079 | 15,65838 |

F = ,268 α = ,765

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 107

## ACCESO AL CONDÓN
## SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 193 | 29,8011 | 15,42842 |
| Estudia y trabaja | 15 | 37,9291 | 21,15535 |
| Está desempleado | 84 | 29,0197 | 14,60670 |
| Es pensionado | 6 | 29,6138 | 13,39892 |
| Recibe Remesas | 4 | 31,7024 | 10,41856 |
| Solo estudia | 8 | 29,9187 | 20,37901 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 82 | 29,1549 | 16,40935 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 3 | 27,3968 | 7,76736 |
| Total | 395 | 29,8099 | 15,67819 |

F = ,640 α = ,723

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 108
## ACCESO AL CONDÓN
## SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 10 | 28,3270 | 9,17639 |
| Técnico medio | 30 | 30,4730 | 13,03719 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 39 | 37,7188 | 20,10894 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 23 | 22,3251 | 10,86823 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 12 | 24,2566 | 8,24304 |
| No calificadas | 94 | 30,2925 | 16,19880 |
| Total | 208 | 30,3872 | 15,98431 |

F = 3,382 α = ,006

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 109
## ACCESO AL CONDÓN

## SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 11 | 25,8225 | 17,70663 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 29,0595 | 2,93793 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 10 | 49,6317 | 17,69681 |
| Empleado de empresa privada | 60 | 31,8087 | 12,80631 |
| Servicio doméstico | 12 | 23,2249 | 9,92405 |
| Cuenta propia | 92 | 30,6039 | 17,23955 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 14 | 22,1168 | 13,91123 |
| Patrono con 10 o más empleados | 5 | 22,3048 | 12,47586 |
| Total | 208 | 30,3872 | 15,98431 |

F = 3,632 α = ,001

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 110
## ACCESO AL CONDÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 96 | 28,5567 | 15,21682 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 29,0159 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 24,6190 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 26,6349 | 3,36718 |
| Total | 100 | 28,4835 | 14,91773 |

F = ,033 α = ,992

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 111
## ACCESO AL CONDÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 34 | 39,6359 | 17,03482 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 8 | 34,6964 | 15,53515 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 6 | 31,7593 | 13,89187 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 9 | 27,6420 | 13,95836 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 100 | 28,9263 | 12,84611 |
| Total | 157 | 31,5743 | 14,60033 |

F = 3,946 α = ,004

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 112
## ACCESO AL CONDÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 15 | 29,4571 | 16,70695 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 41,2698 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 29,7143 | , |
| Total | 17 | 30,1671 | 15,88779 |

F = ,235 α = ,794

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 113
## ACCESO AL CONDÓN

**SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO**

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 1 | 43,4286 | , |
| De 1 a 5 meses | 7 | 27,0544 | 13,74318 |
| De 6 a 11 meses | 15 | 29,0000 | 14,78377 |
| De 1 o 2 años | 63 | 33,7455 | 15,63941 |
| De 3 a 5 años | 91 | 29,6117 | 14,34270 |
| De 6 a 10 años | 110 | 27,3486 | 16,58297 |
| Más de 10 años | 106 | 30,5409 | 15,86600 |
| No recuerda | 3 | 23,2698 | 15,66665 |
| Total | 396 | 29,8079 | 15,65838 |

F = 1,216 α = ,293

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 114**
**ACCESO AL CONDÓN**
**SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL**

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 126 | 30,9836 | 15,57389 |
| Bueno | 160 | 29,7422 | 16,48030 |
| Estable | 92 | 28,7516 | 13,51090 |
| Malo | 15 | 23,6720 | 14,27700 |
| Muy Malo | 3 | 47,0106 | 32,78809 |
| Total | 396 | 29,8079 | 15,65838 |

F = 1,778 α = ,132

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 115**
**ACCESO AL CONDÓN**

## SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 220 | 29,2749 | 15,08679 |
| No | 176 | 30,4742 | 16,36382 |

t = -,757 α = ,450

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 116
## DÓNDE PUEDE CONSEGUIR CONDONES
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Supermercado/Tienda | 264 | 58,3 |
| Farmacia | 373 | 82,3 |
| Centro de Salud/Hospital | 421 | 92,9 |
| ONG | 204 | 45,0 |
| Night Club/Bar/Disco | 95 | 21,0 |
| Casa de citas/Motel | 98 | 21,6 |
| Otro/Especifique | 7 | 1,5 |
| Total | 1462 | 322,7 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 117
## ÚLTIMA VEZ QUE RECIBIÓ CONDONES GRATIS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Menos de una semana | 34 | 7,4 |
| Hace una o dos semanas | 42 | 9,2 |
| De 3 a 4 semanas | 80 | 17,4 |
| De 2 a 6 meses | 150 | 32,7 |
| Más de 6 Meses | 90 | 19,6 |
| Nunca ha recibido | 63 | 13,7 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 118
## CANTIDAD DE CONDONES RECIBIDOS GRATIS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| 12 o menos | 138 | 34,8 |
| De 13 a 24 | 31 | 7,8 |
| De 25 a 64 | 193 | 48,7 |
| De 65 a 99 | 20 | 5,1 |
| Más de 100 | 14 | 3,5 |
| Total | 396 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No responde | | 63 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# ACCESO A LUBRICANTES

El nivel de acceso a lubricantes también resulta bajo, con un promedio de 48,5 y una desviación estándar de 28,9 (ver cuadro #119).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El 55,1% de las personas entrevistadas muestra un nivel muy bajo, mientras que un 27% presenta un acceso muy alto (ver cuadro # 120 y gráfico #10).

El acceso al lubricante es superior entre las personas de menor edad (ver cuadro #121), entre las mujeres trans (ver cuadro #122), las personas de mayor nivel de estudios (ver cuadro #123), entre aquellas que solo estudian (ver cuadro #125), las que trabajan como profesionales (ver cuadro #126), las que trabajan en una ONG (ver cuadro #127), entre los hombres que tienen relaciones sexuales solo con hombres (ver cuadro #129), las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico (ver cuadro #131), mejor percepción del estado de salud (ver cuadro #132) y si tiene pareja estable (ver cuadro #133).

No existen diferencias significativas según condición de migración (ver cuadro #124), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #128) y trans (ver cuadro #130).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

La mayor parte de las personas entrevistadas afirma conocer qué son los lubricantes (ver cuadro #134 y gráfico # 11).

Entre las personas que sí conocen los lubricantes, la gran mayoría menciona el centro de salud y la farmacia como los lugares donde conseguirlos (ver cuadro #135).

El 42,2% de las personas que lo conocen afirma que solo lo utiliza a veces y un 24,9% dice no hacerlo nunca (ver cuadro #136). Cuando sí se usa, la inmensa mayoría de las veces es uno a base de agua (ver cuadro #137).

Casi la mitad de las personas que conoce los lubricantes afirma disponer de ellos en el momento de la entrevista (ver cuadro #138).

Por último, un 65,7% afirma recibir lubricantes cuando le regalan condones (ver cuadro #139).

## Cuadro # 119
## ACCESO A LUBRICANTE
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | ,00 | 96,43 | 48,4983 | 28,97593 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 120
## ACCESO A LUBRICANTE

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy bajo | 68 | 14,8 |
| Medio bajo | 185 | 40,3 |
| Medio alto | 82 | 17,9 |
| Muy alto | 124 | 27,0 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 121
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 47,1125 | 31,13177 |
| De 26 a 35 | 141 | 52,2543 | 29,64627 |
| De 36 a 45 | 152 | 49,9530 | 27,51410 |
| De 46 a 60 | 96 | 44,8661 | 27,40971 |
| Más de 60 | 23 | 33,8509 | 32,06827 |
| Total | 459 | 48,4983 | 28,97593 |

$F = 2,597$ $\alpha = ,036$

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 122
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 197 | 41,0442 | 29,23478 |
| Masculino | 242 | 53,6157 | 27,59038 |
| Mujer trans | 13 | 63,4615 | 26,00668 |
| Hombre trans | 7 | 53,5714 | 29,08760 |
| Total | 459 | 48,4983 | 28,97593 |

F = 8,485 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 123
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 23,2143 | 18,17573 |
| Alfabetizada | 6 | 40,4762 | 28,63089 |
| Primaria incompleta | 112 | 42,6020 | 27,80799 |
| Primaria completa | 73 | 50,0978 | 28,92252 |
| Secundaria incompleta | 53 | 49,7978 | 25,53792 |
| Secundaria completa | 108 | 56,0185 | 30,22441 |
| Universitaria incompleta | 33 | 62,7706 | 19,45999 |
| Universitaria completa | 8 | 64,2857 | 27,06487 |
| Post grado universitario | 1 | 96,4286 | , |
| Total | 400 | 50,4554 | 28,52692 |

F = 3,898 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 124
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 102 | 46,2185 | 24,94601 |
| Migró a otro país | 4 | 55,3571 | 19,45254 |
| No migró | 353 | 49,0793 | 30,13764 |
| Total | 459 | 48,4983 | 28,97593 |

F = ,498 α = ,608

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 125
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 49,0154 | 25,87541 |
| Estudia y trabaja | 17 | 53,1513 | 31,51374 |
| Está desempleado | 100 | 53,7143 | 29,87175 |
| Es pensionado | 8 | 40,6250 | 40,62815 |
| Recibe Remesas | 9 | 61,5079 | 31,42947 |
| Solo estudia | 9 | 54,7619 | 34,90146 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 41,8899 | 30,65907 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 11,4286 | 25,55506 |
| Total | 458 | 48,5028 | 29,00745 |

F = 2,897 α = ,006

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 126
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 64,6104 | 24,35152 |
| Técnico medio | 33 | 40,1515 | 20,34128 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 66,1150 | 25,86664 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 49,0000 | 28,69245 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 39,8352 | 25,49869 |
| No calificadas | 108 | 45,4034 | 24,74865 |
| Total | 231 | 49,3197 | 26,27370 |

F = 6,389 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 127
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 52,3810 | 23,31190 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 65,1786 | 26,30521 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 81,1688 | 18,14700 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 53,6848 | 25,37546 |
| Servicio doméstico | 15 | 38,5714 | 30,57991 |
| Cuenta propia | 103 | 46,5326 | 24,16811 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 37,2768 | 27,29185 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 37,2449 | 26,79422 |
| Total | 231 | 49,3197 | 26,27370 |

F = 4,422 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 128
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 46,6837 | 29,88346 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 96,4286 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 28,5714 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 69,6429 | 32,82996 |
| Total | 116 | 47,3522 | 30,07356 |

F = 1,418 α = ,241

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 129
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 73,3135 | 19,75591 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 57,1429 | 33,78730 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 70,9184 | 24,43482 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 71,0714 | 22,30039 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 111 | 53,1532 | 28,22328 |
| Total | 173 | 59,3105 | 27,71408 |

F = 4,834 α = ,001

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 130
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 60,4911 | 24,30912 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 85,7143 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 64,2857 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | ,0000 | , |
| Total | 19 | 58,8346 | 26,99963 |

F = 2,402 α = ,108

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 131
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 13,3929 | 26,78571 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 29,4118 | 23,77514 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 47,1429 | 26,66577 |
| De 1 o 2 años | 71 | 60,3119 | 30,33792 |
| De 3 a 5 años | 103 | 51,3176 | 31,95553 |
| De 6 a 10 años | 118 | 48,0024 | 24,66655 |
| Más de 10 años | 123 | 43,8734 | 27,48795 |
| No recuerda | 3 | 45,2381 | 40,61601 |
| Total | 459 | 48,4983 | 28,97593 |

F = 4,399 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 132
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 53,5215 | 30,22737 |
| Bueno | 183 | 50,7416 | 28,26329 |
| Estable | 105 | 41,6327 | 26,30441 |
| Malo | 23 | 34,1615 | 26,76571 |
| Muy Malo | 4 | 41,0714 | 40,45868 |
| Total | 458 | 48,6042 | 28,91857 |

F = 4,441 α = ,002

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 133
## ACCESO A LUBRICANTE
## SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 54,1386 | 29,22882 |
| No | 225 | 42,8730 | 27,50418 |

t = 4,249 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 134
## CONOCE LOS LUBRICANTES QUE AYUDAN A LA PENETRACIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 393 | 86,8 |
| No | 60 | 13,2 |
| Total | 453 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 6 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 135
## DÓNDE PUEDE CONSEGUIR LUBRICANTES
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Supermercado/Tienda | 191 | 48,8 |
| Farmacia | 315 | 80,6 |
| Centro de Salud/Hospital | 359 | 91,8 |
| ONG | 183 | 46,8 |
| Night Club/Bar/Disco | 62 | 15,9 |
| Casa de citas/Motel | 62 | 15,9 |
| Total | 1172 | 299,7 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro 136
## FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRA USTED UTILIZAR LUBRICANTE

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Siempre | 121 | 30,8 |
| A veces | 166 | 42,2 |
| Nunca | 98 | 24,9 |
| No Contesta | 8 | 2,0 |
| Total | 393 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No conoce los lubricantes | | 66 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 137
## TIPO DE LUBRICANTE UTILIZADO
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Lubricante a base de agua | 268 | 95,4 |
| Vaselina | 4 | 1,4 |
| Cremas para la piel o de mano | 6 | 2,1 |
| Gel vaginal | 15 | 5,3 |
| Aceite de bebé | 3 | 1,1 |
| Mantequilla | 1 | 0,4 |
| Aceite de cocinar | 1 | 0,4 |
| Saliva | 34 | 12,1 |
| Otro/ Especificar | 1 | 0,4 |
| Total | 333 | 118,5 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 138
## DISPONE EN ESTE MOMENTO DE LUBRICANTES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 142 | 49,5 |
| No | 145 | 50,5 |
| Total | 287 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No conoce los lubricantes | | 66 |
| No usa | | 106 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 139
## CUANDO LE DAN CONDONES, LE DAN TAMBIÉN LUBRICANTES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 188 | 65,7 |
| No | 98 | 34,3 |
| Total | 286 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |
| No conoce los lubricantes | | 66 |
| No usa | | 106 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# TIEMPO DESDE QUE RECIBIÓ EL DIAGNÓSTICO




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

La mayoría de las personas entrevistadas tiene tres o más años de haber recibido el diagnóstico de VIH (ver cuadro # 140 y gráfico #12).

El tiempo transcurrido está en relación con la edad de la persona entrevistada (ver cuadro #141), es superior entre las personas que se identifican con el género femenino (ver cuadro #142), entre los que han tenido que migrar (ver cuadro #144), entre las personas que solo trabajan (ver cuadro #145) y las que trabajan para el gobierno (ver cuadro #147).

No existen diferencias significativas según nivel de estudios (ver cuadro #143), ocupación (ver cuadro #146), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #148), los hombres (ver cuadro #149) y trans (ver cuadro #150), percepción del estado de salud (ver cuadro #151) y si tiene pareja estable (ver cuadro #152).

## Cuadro # 140
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | ,9 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 3,7 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 4,4 |
| De 1 o 2 años | 71 | 15,5 |
| De 3 a 5 años | 103 | 22,4 |
| De 6 a 10 años | 118 | 25,7 |
| Más de 10 años | 123 | 26,8 |
| No recuerda | 3 | ,7 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 141
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | 25 o menos | De 26 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 60 | Más de 60 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | | 1,4 | 1,3 | | | 0,9 |
| De 1 a 5 meses | 14,9 | 5,7 | 1,3 | | | 3,7 |
| De 6 a 11 meses | 2,1 | 5,0 | 4,6 | 5,2 | | 4,4 |
| De 1 o 2 años | 25,5 | 24,8 | 9,9 | 7,3 | 8,7 | 15,5 |
| De 3 a 5 años | 31,9 | 24,8 | 20,4 | 16,7 | 26,1 | 22,4 |
| De 6 a 10 años | 19,1 | 23,4 | 29,6 | 30,2 | 8,7 | 25,7 |
| Más de 10 años | 6,4 | 14,9 | 32,2 | 39,6 | 52,2 | 26,8 |
| No recuerda | | | 0,7 | 1,0 | 4,3 | 0,7 |

$\chi^2$ = 90,678 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 142
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | Femenino | Masculino | Mujer trans | Hombre trans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 0,5 | 1,2 | | | 0,9 |
| De 1 a 5 meses | 3,0 | 3,7 | 7,7 | 14,3 | 3,7 |
| De 6 a 11 meses | 1,5 | 6,2 | | 28,6 | 4,4 |
| De 1 o 2 años | 11,2 | 18,6 | 7,7 | 42,9 | 15,5 |
| De 3 a 5 años | 22,8 | 22,3 | 30,8 | | 22,4 |
| De 6 a 10 años | 27,9 | 24,4 | 23,1 | 14,3 | 25,7 |
| Más de 10 años | 32,5 | 22,7 | 30,8 | | 26,8 |
| No recuerda | 0,5 | 0,8 | | | 0,7 |

$\chi^2$ = 36,097 α = ,021

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 143
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | No asistió a la escuela | Alfabetizada | Primaria incompleta | Primaria completa | Secundaria incompleta | Secundaria completa | Universitaria incompleta | Universitaria completa | Post grado universitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | | | 0,9 | | | | | | | 0,2 |
| De 1 a 5 meses | | 16,7 | 1,8 | 1,4 | | 3,7 | 15,2 | | | 3,2 |
| De 6 a 11 meses | | 16,7 | 3,6 | 4,1 | 5,7 | 1,9 | 3,0 | | | 3,5 |
| De 1 o 2 años | | 33,3 | 8,9 | 16,4 | 17,0 | 22,2 | 15,2 | 25,0 | | 16,0 |
| De 3 a 5 años | 16,7 | | 24,1 | 19,2 | 26,4 | 20,4 | 30,3 | 12,5 | 100,0 | 22,5 |
| De 6 a 10 años | 33,3 | 33,3 | 34,8 | 28,8 | 24,5 | 20,4 | 15,2 | 12,5 | | 26,2 |
| Más de 10 años | 50,0 | | 25,9 | 28,8 | 26,4 | 31,5 | 21,2 | 50,0 | | 28,0 |
| No recuerda | | | | 1,4 | | | | | | 0,2 |

$\chi^2$ = 61,995 α = ,271

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 144
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | Migró dentro del país | Migró a otro país | No migró | Total |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 1,0 | | 0,8 | 0,9 |
| De 1 a 5 meses | | | 4,8 | 3,7 |
| De 6 a 11 meses | 1,0 | 50,0 | 4,8 | 4,4 |
| De 1 o 2 años | 9,8 | | 17,3 | 15,5 |
| De 3 a 5 años | 15,7 | 25,0 | 24,4 | 22,4 |
| De 6 a 10 años | 27,5 | 25,0 | 25,2 | 25,7 |
| Más de 10 años | 44,1 | | 22,1 | 26,8 |
| No recuerda | 1,0 | | 0,6 | 0,7 |

$\chi^2$ = 49,060 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 145
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | Solo trabaja | Estudia y trabaja | Está desempleado | Es pensionado | Recibe Remesas | Solo estudia | Solo se dedica a tareas del hogar | No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 0,5 | | 3,0 | | | | | | 0,9 |
| De 1 a 5 meses | 3,3 | | 5,0 | | 11,1 | 11,1 | 3,1 | | 3,7 |
| De 6 a 11 meses | 3,7 | 5,9 | 8,0 | 12,5 | | | 2,1 | | 4,4 |
| De 1 o 2 años | 12,6 | 17,6 | 16,0 | 50,0 | 66,7 | 33,3 | 11,5 | 20,0 | 15,5 |
| De 3 a 5 años | 19,6 | 5,9 | 26,0 | 25,0 | 11,1 | 22,2 | 27,1 | 60,0 | 22,5 |
| De 6 a 10 años | 25,7 | 41,2 | 22,0 | | 11,1 | 22,2 | 32,3 | | 25,8 |
| Más de 10 años | 33,6 | 29,4 | 20,0 | 12,5 | | 11,1 | 22,9 | 20,0 | 26,6 |
| No recuerda | 0,9 | | | | | | 1,0 | | 0,7 |

$\chi^2$ = 70,721 α = ,023

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 146**
**HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL**

| | Profesional | Técnico medio | Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | Calificadas de industrias, construcción y operación | No calificadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | | | | 4,0 | | | 0,4 |
| De 1 a 5 meses | | 9,1 | 2,4 | | | 2,8 | 3,0 |
| De 6 a 11 meses | | 6,1 | 2,4 | 8,0 | 15,4 | 1,9 | 3,9 |
| De 1 o 2 años | 18,2 | 18,2 | 22,0 | 8,0 | 7,7 | 9,3 | 13,0 |
| De 3 a 5 años | 27,3 | 18,2 | 14,6 | 20,0 | 15,4 | 19,4 | 18,6 |
| De 6 a 10 años | 36,4 | 18,2 | 17,1 | 32,0 | 38,5 | 29,6 | 26,8 |
| Más de 10 años | 18,2 | 30,3 | 41,5 | 28,0 | 23,1 | 35,2 | 33,3 |
| No recuerda | | | | | | 1,9 | 0,9 |

$\chi^2$ = 36,427 α = ,402

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 147
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | No remunerado | Empleado del Gobierno o Institución | Empleado de Organización No Gubernamental | Empleado de empresa privada | Servicio doméstico | Cuenta propia | Patrono con menos de 10 empleados | Patrono con 10 o más empleados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | | | | | | | 6,2 | | 0,4 |
| De 1 a 5 meses | | | | 4,8 | | 1,9 | 6,2 | 14,3 | 3,0 |
| De 6 a 11 meses | | | | 6,3 | | 4,9 | | | 3,9 |
| De 1 o 2 años | | 25,0 | 9,1 | 25,4 | 13,3 | 9,7 | | | 13,0 |
| De 3 a 5 años | 16,7 | | 9,1 | 19,0 | 20,0 | 19,4 | 31,2 | | 18,6 |
| De 6 a 10 años | 41,7 | | 18,2 | 25,4 | 6,7 | 31,1 | 31,2 | 14,3 | 26,8 |
| Más de 10 años | 33,3 | 75,0 | 63,6 | 19,0 | 53,3 | 33,0 | 25,0 | 71,4 | 33,3 |
| No recuerda | 8,3 | | | | 6,7 | | | | 0,9 |

$\chi^2$ = 75,819 α = ,008

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 148
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Solo practica el sexo con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| De 1 a 5 meses | 2,7 | | | | 2,6 |
| De 6 a 11 meses | 0,9 | | | | 0,9 |
| De 1 o 2 años | 14,3 | | | | 13,8 |
| De 3 a 5 años | 23,2 | | | 50,0 | 23,3 |
| De 6 a 10 años | 26,8 | | | | 25,9 |
| Más de 10 años | 32,1 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 33,6 |

$\chi^2$ = 5,719 α = ,984

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 149
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Solo practica el sexo con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 1 a 5 meses | 2,8 | | 14,3 | 10,0 | 2,7 | 3,5 |
| De 6 a 11 meses | 5,6 | | | 20,0 | 5,4 | 5,8 |
| De 1 o 2 años | 27,8 | 33,3 | 14,3 | 50,0 | 18,9 | 23,1 |
| De 3 a 5 años | 13,9 | 33,3 | 28,6 | 10,0 | 26,1 | 23,1 |
| De 6 a 10 años | 25,0 | 22,2 | 28,6 | | 23,4 | 22,5 |
| Más de 10 años | 25,0 | 11,1 | 14,3 | 10,0 | 23,4 | 22,0 |

$\chi^2$ = 20,631 α = ,419

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 150
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| De 1 a 5 meses | 6,2 | | | 100,0 | 10,5 |
| De 6 a 11 meses | 6,2 | | | | 5,3 |
| De 1 o 2 años | 18,8 | 100,0 | | | 21,1 |
| De 3 a 5 años | 25,0 | | | | 21,1 |
| De 6 a 10 años | 18,8 | | 100,0 | | 21,1 |
| Más de 10 años | 25,0 | | | | 21,1 |

$\chi^2$ = 16,625 α = ,342

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 151
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | Muy Bueno | Bueno | Estable | Malo | Muy Malo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | | 1,1 | 1,0 | | | 0,7 |
| De 1 a 5 meses | 1,4 | 3,8 | 5,7 | 8,7 | | 3,7 |
| De 6 a 11 meses | 2,1 | 3,3 | 8,6 | 8,7 | | 4,4 |
| De 1 o 2 años | 17,5 | 18,0 | 11,4 | 4,3 | | 15,5 |
| De 3 a 5 años | 28,7 | 18,6 | 24,8 | 8,7 | | 22,5 |
| De 6 a 10 años | 21,7 | 30,1 | 22,9 | 30,4 | 25,0 | 25,8 |
| Más de 10 años | 28,7 | 23,5 | 25,7 | 39,1 | 75,0 | 26,9 |
| No recuerda | | 1,6 | | | | 0,7 |

$\chi^2$ = 38,764 α = ,085

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 152
## HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO SEGÚN ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | Sí | No | Total |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 1,3 | 0,4 | 0,9 |
| De 1 a 5 meses | 2,1 | 4,9 | 3,5 |
| De 6 a 11 meses | 4,7 | 4,0 | 4,4 |
| De 1 o 2 años | 17,2 | 13,8 | 15,5 |
| De 3 a 5 años | 23,6 | 21,3 | 22,5 |
| De 6 a 10 años | 24,0 | 27,6 | 25,8 |
| Más de 10 años | 26,6 | 27,1 | 26,9 |
| No recuerda | 0,4 | 0,9 | 0,7 |

$\chi^2$ = 5,575 α = ,590

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD

El nivel de acceso de las personas entrevistadas a servicios de salud de calidad resulta moderadamente bajo, con un promedio de 45,4, en una escala de 0 a 100 y con un nivel de variabilidad moderado, con una desviación estándar de 12,9 (ver cuadro #153).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El 57,3% de las personas entrevistadas tienen un nivel medio bajo de acceso a servicios de salud de calidad, mientras que solo un 2,6% muestra un nivel muy alto (ver cuadro # 154 y gráfico #13).

El nivel de acceso mejora entre las personas con menor edad (ver cuadro #155), menor nivel de estudios (ver cuadro #157), entre técnicos medios y personal de apoyo administrativo (ver cuadro #160) y peor percepción del estado de salud (ver cuadro #166).

No se observan diferencias significativas según identidad de género (ver cuadro #156), condición de migración (ver cuadro #158), nivel de actividad (ver cuadro #159), relación laboral (ver cuadro #161), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #162), hombres (ver cuadro #163) y trans (ver cuadro #164), tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #165) y si tiene pareja estable (ver cuadro #167).

Entre las principales razones para hacerse el examen del VIH, sobresale el hecho de estar enfermo y la decisión voluntaria (ver cuadro #1|68).

El 65% de las personas entrevistadas recibió consejería antes de realizarse el examen de VIH (ver cuadro #169) y el 79,6% afirma haberla recibido también después de resultar positiva la prueba (ver cuadro #170).

Dos terceras partes de la muestra se realizaron la prueba en un centro de salud público (ver cuadro #171).

Cuando asiste a control, la mayoría de las personas recibe atención de un médico especialista y consejería, pero solo cerca de la mitad de parte de un profesional en enfermería y solo un 43,6% por parte de un médico general (ver cuadro #172).

El tiempo necesario para llegar al centro de salud es en promedio de dos horas y media (ver cuadro #173) y el costo anda alrededor de 3,22 dólares (ver cuadro #174).

En cada cita de control, la persona tiende a recibir diversos servicios, entre los que sobresalen consulta médica, tratamiento antirretroviral y exámenes de laboratorio (ver cuadro #175).

A un 35,6% le han cambiado alguna vez el esquema de antirretrovirales (ver cuadro #176), a la gran mayoría de estos se le ha informado al darle un nuevo tratamiento (ver cuadro #177), y a un 64,6% se le ha solicitado su consentimiento (ver cuadro #178).

Por otra parte, al 88,7% se le informa sobre los posibles efectos secundarios (ver cuadro #179).

El 82% considera que después del diagnóstico de VIH cuida más su salud (ver cuadro #180) y solamente un 19% ha tenido algún problema de salud en los últimos 3 meses (ver cuadro #181).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

La mayoría de las personas entrevistadas considera que su estado de salud es bueno o muy bueno (ver cuadro #182 y gráfico # 14).

La percepción tiende a ser mejor entre las personas de mayor nivel educativo (ver cuadro #185), los profesionales (ver cuadro #188), aquellas personas que trabajan para el Gobierno o para una ONG (ver cuadro #189) y entre las mujeres que solo tienen relaciones con mujeres (ver cuadro #190).

La percepción del estado de salud no muestra diferencias significativas según edad (ver cuadro #183), identidad de género (ver cuadro #184), condición de migración (ver cuadro #186), actividad sexual de los hombres (ver cuadro #191) y trans (ver cuadro #192), tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #193), percepción del estado de salud (ver cuadro #194) y si tiene pareja estable (ver cuadro #195).

Solamente un 5,7% ha tenido que pagar por servicios de salud públicos (ver cuadro #195), mencionando la consulta a especialista y los medicamentos (ver cuadro #196). Mientras que

un 20,5% asegura que ha tenido que pagar servicios de salud privados (ver cuadro #197), en donde sobresalen la consulta general y los exámenes de laboratorio (ver cuadro #198).

**Cuadro # 153**
**ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD**
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 15,11 | 88,37 | 48,8429 | 12,89263 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 154**
**ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy bajo | 11 | 2,4 |
| Medio bajo | 263 | 57,3 |
| Medio alto | 173 | 37,7 |
| Muy alto | 12 | 2,6 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 155
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 50,8509 | 12,22831 |
| De 26 a 35 | 141 | 47,6363 | 11,71674 |
| De 36 a 45 | 152 | 49,7232 | 13,57423 |
| De 46 a 60 | 96 | 49,9782 | 13,52308 |
| Más de 60 | 23 | 41,5804 | 11,64840 |
| Total | 459 | 48,8429 | 12,89263 |

F = 2,826 α = ,025

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 156
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 197 | 49,0538 | 14,39869 |
| Masculino | 242 | 48,5862 | 11,52045 |
| Mujer trans | 13 | 53,2413 | 12,38115 |
| Hombre trans | 7 | 43,6147 | 14,14665 |
| Total | 459 | 48,8429 | 12,89263 |

F = ,937 α = ,423

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 157
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 43,9773 | 5,65143 |
| Alfabetizada | 6 | 54,4318 | 11,12706 |
| Primaria incompleta | 112 | 47,6406 | 13,10640 |
| Primaria completa | 73 | 48,6533 | 12,30983 |
| Secundaria incompleta | 53 | 51,2501 | 11,89172 |
| Secundaria completa | 108 | 52,0790 | 12,76941 |
| Universitaria incompleta | 33 | 50,4500 | 10,95879 |
| Universitaria completa | 8 | 53,9384 | 12,68055 |
| Post grado universitario | 1 | 23,6364 | , |
| Total | 400 | 49,8467 | 12,56393 |

F = 1,984 α = ,047

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 158
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 102 | 49,6214 | 13,36963 |
| Migró a otro país | 4 | 35,4924 | 12,65390 |
| No migró | 353 | 48,7692 | 12,70493 |
| Total | 459 | 48,8429 | 12,89263 |

F = 2,350 α = ,097

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 159
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 48,5236 | 12,39009 |
| Estudia y trabaja | 17 | 50,1119 | 13,05358 |
| Está desempleado | 100 | 49,5085 | 13,26562 |
| Es pensionado | 8 | 47,7888 | 8,38118 |
| Recibe Remesas | 9 | 44,8106 | 6,54339 |
| Solo estudia | 9 | 47,7189 | 7,02130 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 49,2847 | 14,67371 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 48,1061 | 18,04947 |
| Total | 458 | 48,8509 | 12,90557 |

F = ,239 α = ,976

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 160
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 43,0351 | 12,03828 |
| Técnico medio | 33 | 52,0131 | 12,89579 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 53,8950 | 13,37331 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 45,8658 | 13,31323 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 44,1037 | 7,13389 |
| No calificadas | 108 | 47,3744 | 11,51564 |
| Total | 231 | 48,6405 | 12,41748 |

F = 3,392 α = ,006

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 161
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 46,7708 | 13,40287 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 53,0436 | 14,03873 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 56,1846 | 14,86260 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 50,8977 | 12,12650 |
| Servicio doméstico | 15 | 47,5490 | 12,15264 |
| Cuenta propia | 103 | 47,1909 | 12,39220 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 45,0317 | 8,23723 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 49,0768 | 14,78421 |
| Total | 231 | 48,6405 | 12,41748 |

F = 1,417 α = ,199

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 162
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 52,1725 | 13,80417 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 43,8106 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 72,2727 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 47,8258 | 11,03515 |
| Total | 116 | 52,1987 | 13,76354 |

F = ,898 α = ,445

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 163
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 50,7687 | 10,73440 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 48,9495 | 9,42063 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 52,0530 | 16,46171 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 51,6977 | 13,16824 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 111 | 49,5402 | 12,33822 |
| Total | 173 | 49,9915 | 12,00483 |

F = ,192 α = ,942

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 164
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 50,4886 | 13,14341 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 56,2121 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 48,9015 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 61,0606 | , |
| Total | 19 | 51,2628 | 12,30830 |

F = ,262 α = ,852

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 165
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 39,0758 | 2,79536 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 44,2736 | 11,90897 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 47,8295 | 10,30681 |
| De 1 o 2 años | 71 | 47,4835 | 8,60338 |
| De 3 a 5 años | 103 | 49,3365 | 12,14199 |
| De 6 a 10 años | 118 | 50,1708 | 13,94739 |
| Más de 10 años | 123 | 49,1351 | 15,03547 |
| No recuerda | 3 | 45,5303 | 6,85355 |
| Total | 459 | 48,8429 | 12,89263 |

F = 1,001 α = ,430

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 166
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD
## SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 47,3766 | 11,69448 |
| Bueno | 183 | 46,9712 | 11,57214 |
| Estable | 105 | 53,9955 | 14,50886 |
| Malo | 23 | 49,5208 | 15,35772 |
| Muy Malo | 4 | 50,1364 | 21,67300 |
| Total | 458 | 48,8638 | 12,89892 |

F = 5,881 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 167
## ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD SEGÚN ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 48,6678 | 13,16042 |
| No | 225 | 49,0810 | 12,63566 |

t = -,343 α = ,732

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 168
## RAZÓN POR LA QUE DECIDIÓ HACERSE LA PRUEBA DE VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Se la hizo voluntariamente | 99 | 21,6 |
| Se la solicitaron | 27 | 5,9 |
| Porque estaba enfermo | 190 | 41,4 |
| Porque su pareja fue diagnosticada con VIH o Sida | 87 | 19,0 |
| Al donar sangre | 11 | 2,4 |
| Otro/ Especificar | 45 | 9,8 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 169
## RECIBIÓ CONSEJERÍA ANTES DE LA PRUEBA DE VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 295 | 65,0 |
| No | 159 | 35,0 |
| Total | 454 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 5 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 170
## RECIBIÓ USTED CONSEJERÍA DESPUÉS DE RESULTAR POSITIVA LA PRUEBA DE VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 360 | 79,6 |
| No | 92 | 20,4 |
| Total | 452 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 7 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 171
## DÓNDE SE HIZO LA PRUEBA DE VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Centro de salud/ Hospital Público | 310 | 67,5 |
| Seguro social | 8 | 1,7 |
| Clínica/Laboratorio privado | 95 | 20,7 |
| Cruz Roja | 8 | 1,7 |
| ONG | 31 | 6,8 |
| Otro/Especifique | 7 | 1,5 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 172
## PROFESIONALES QUE HAN BRINDADO ATENCIÓN
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Médico/a especialista | 329 | 72,1 |
| Médico/a general | 199 | 43,6 |
| Enfermero/a | 243 | 53,3 |
| Consejero/a | 306 | 67,1 |
| Otro | 70 | 15,4 |
| Total | 1147 | 251,5 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 173
## TIEMPO PARA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 1,00 | 4,00 | 2,3704 | ,86292 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 174
## COSTO PARA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 1,00 | 4,00 | 3,2222 | 1,12274 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 175
## SERVICIOS DE SALUD EN CADA CONTROL
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Consulta médica | 445 | 97,2 |
| Tratamiento antirretroviral | 423 | 92,4 |
| Exámenes especiales (CD4 y Carga Viral | 395 | 86,2 |
| Exámenes de laboratorio | 352 | 76,9 |
| Servicio psicológico | 343 | 74,9 |
| Consejería y educación | 261 | 57,0 |
| Asesoría nutricional | 260 | 56,8 |
| Tratamiento por enfermedades oportunistas | 176 | 38,4 |
| Servicio de salud sexual yreproductiva | 92 | 20,1 |
| Servicio odontológico | 17 | 3,7 |
| Otro/Especifique | 26 | 5,7 |
| Total | 2790 | 609,2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 176
## HAN CAMBIADO ALGUNA VEZ EL ESQUEMA DE ANTIRRETROVIRALES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 159 | 35,6 |
| No | 288 | 64,4 |
| Total | 447 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 12 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 177
## SE LE INFORMA AL DARLE UN NUEVO TRATAMIENTO O SERVICIO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 147 | 92,5 |
| No | 12 | 7,5 |
| Total | 159 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No le han cambiado | | 300 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 178
## SE HA SOLICITADO SU CONSENTIMIENTO ANTE UN NUEVO TRATAMIENTO O SERVICIO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 102 | 64,6 |
| No | 56 | 35,4 |
| Total | 158 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |
| No le han cambiado | | 300 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 179
## SE LE INFORMA SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 141 | 88,7 |
| No | 18 | 11,3 |
| Total | 159 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No le han cambiado | | 300 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 180
## DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO, CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Menos | 11 | 2,4 |
| Igual | 71 | 15,6 |
| Más | 374 | 82,0 |
| Total | 456 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 3 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 181
## HA TENIDO ALGÚN PROBLEMA DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 87 | 19,0 |
| No | 371 | 81,0 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 182
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 31,2 |
| Bueno | 183 | 40,0 |
| Estable | 105 | 22,9 |
| Malo | 23 | 5,0 |
| Muy Malo | 4 | ,9 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 183
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL
## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | 25 o menos | De 26 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 60 | Más de 60 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 36,2 | 39,7 | 23,8 | 27,1 | 34,8 | 31,2 |
| Bueno | 34,0 | 36,9 | 45,0 | 40,6 | 34,8 | 40,0 |
| Estable | 27,7 | 17,7 | 25,2 | 26,0 | 17,4 | 22,9 |
| Malo | 2,1 | 5,7 | 5,3 | 4,2 | 8,7 | 5,0 |
| Muy Malo | | | 0,7 | 2,1 | 4,3 | 0,9 |

$\chi^2$ = 20,121 α = ,215

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 184
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL
## SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | Femenino | Masculino | Mujer trans | Hombre trans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 29,1 | 34,3 | 23,1 | | 31,2 |
| Bueno | 39,3 | 39,7 | 53,8 | 42,9 | 40,0 |
| Estable | 25,0 | 21,1 | 15,4 | 42,9 | 22,9 |
| Malo | 4,6 | 5,0 | 7,7 | 14,3 | 5,0 |
| Muy Malo | 2,0 | | | | 0,9 |

$\chi^2$ = 13,219 α = ,353

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 185
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | No asistió a la escuela | Alfabetizada | Primaria incompleta | Primaria completa | Secundaria incompleta | Secundaria completa | Universitaria incompleta | Universitaria completa | Post grado universitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 33,3 | 16,7 | 26,8 | 24,7 | 24,5 | 38,9 | 45,5 | 87,5 | 100,0 | 32,2 |
| Bueno | | 16,7 | 40,2 | 52,1 | 49,1 | 31,5 | 39,4 | | | 39,2 |
| Estable | 33,3 | 66,7 | 25,0 | 21,9 | 20,8 | 27,8 | 15,2 | | | 24,0 |
| Malo | 33,3 | | 7,1 | 1,4 | 5,7 | 1,9 | | | | 4,0 |
| Muy Malo | | | 0,9 | | | | | 12,5 | | 0,5 |

$\chi^2$ = 83,042 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 186
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | Migró dentro del país | Migró a otro país | No migró | Total |
|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 27,5 | | 32,7 | 31,2 |
| Bueno | 40,2 | | 40,3 | 40,0 |
| Estable | 25,5 | 100,0 | 21,3 | 22,9 |
| Malo | 5,9 | | 4,8 | 5,0 |
| Muy Malo | 1,0 | | 0,9 | 0,9 |

$\chi^2$ = 15,050 α = ,058

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 187
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | Solo trabaja | Estudia y trabaja | Está desempleado | Es pensionado | Recibe Remesas | Solo estudia | Solo se dedica a tareas del hogar | No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 31,0 | 64,7 | 33,0 | 12,5 | 33,3 | 55,6 | 25,0 | | 31,3 |
| Bueno | 42,7 | 29,4 | 36,0 | 37,5 | 22,2 | 33,3 | 42,7 | 40,0 | 40,0 |
| Estable | 22,5 | 5,9 | 22,0 | 37,5 | 33,3 | 11,1 | 27,1 | 20,0 | 23,0 |
| Malo | 3,3 | | 8,0 | 12,5 | 11,1 | | 3,1 | 40,0 | 4,8 |
| Muy Malo | 0,5 | | 1,0 | | | | 2,1 | | 0,9 |

$\chi^2$ = 40,456 α = ,060

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 188
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | Profesional | Técnico medio | Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | Calificadas de industrias, construcción y operación | No calificadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 72,7 | 36,4 | 46,3 | 37,5 | 15,4 | 25,0 | 33,5 |
| Bueno | 18,2 | 24,2 | 29,3 | 50,0 | 46,2 | 51,9 | 41,7 |
| Estable | 9,1 | 39,4 | 19,5 | 12,5 | 30,8 | 18,5 | 21,3 |
| Malo | | | 2,4 | | 7,7 | 4,6 | 3,0 |
| Muy Malo | | | 2,4 | | | | 0,4 |

$\chi^2$ = 35,644 α = ,017

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 189
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | No remunerado | Empleado del Gobierno o Institución | Empleado de Organización No Gubernamental | Empleado de empresa privada | Servicio doméstico | Cuenta propia | Patrono con menos de 10 empleados | Patrono con 10 o más empleados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 25,0 | 75,0 | 72,7 | 39,7 | 26,7 | 25,2 | 46,7 | 14,3 | 33,5 |
| Bueno | 58,3 | | 18,2 | 33,3 | 46,7 | 50,5 | 33,3 | 28,6 | 41,7 |
| Estable | 16,7 | 25,0 | 9,1 | 27,0 | 26,7 | 19,4 | 13,3 | 28,6 | 21,3 |
| Malo | | | | | | 3,9 | 6,7 | 28,6 | 3,0 |
| Muy Malo | | | | | | 1,0 | | | 0,4 |

$\chi^2$ = 42,627 α = ,038

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 190
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Solo practica el sexo con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 23,2 | | | 50,0 | 23,3 |
| Bueno | 42,0 | | | | 40,5 |
| Estable | 28,6 | | 100,0 | 50,0 | 29,3 |
| Malo | 4,5 | 100,0 | | | 5,2 |
| Muy Malo | 1,8 | | | | 1,7 |

$\chi^2$ = 22,789 α = ,030

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 191
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Solo practica el sexo con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 47,2 | 66,7 | 14,3 | 50,0 | 34,2 | 38,7 |
| Bueno | 41,7 | 11,1 | 57,1 | 40,0 | 34,2 | 35,8 |
| Estable | 11,1 | 22,2 | 28,6 | 10,0 | 27,0 | 22,5 |
| Malo | | | | | 4,5 | 2,9 |

$\chi^2$ = 14,044 α = ,298

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 192
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 18,8 | | | | 15,8 |
| Bueno | 56,2 | 100,0 | | | 52,6 |
| Estable | 12,5 | | 100,0 | 100,0 | 21,1 |
| Malo | 12,5 | | | | 10,5 |

$\chi^2$ = 9,144 α = ,424

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 193
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | Menos de 1 mes | De 1 a 5 meses | De 6 a 11 meses | De 1 o 2 años | De 3 a 5 años | De 6 a 10 años | Más de 10 años | No recuerda | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Bueno | | 11,8 | 15,0 | 35,2 | 39,8 | 26,3 | 33,3 | | 31,2 |
| Bueno | 66,7 | 41,2 | 30,0 | 46,5 | 33,0 | 46,6 | 35,0 | 100,0 | 40,0 |
| Estable | 33,3 | 35,3 | 45,0 | 16,9 | 25,2 | 20,3 | 22,0 | | 22,9 |
| Malo | | 11,8 | 10,0 | 1,4 | 1,9 | 5,9 | 7,3 | | 5,0 |
| Muy Malo | | | | | | 0,8 | 2,4 | | 0,9 |

$\chi^2$ = 38,764 α = ,085

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 194
## CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL
## SEGÚN ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | Sí | No | Total |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 34,1 | 28,4 | 31,3 |
| Bueno | 39,2 | 40,9 | 40,0 |
| Estable | 22,0 | 24,0 | 23,0 |
| Malo | 4,3 | 5,3 | 4,8 |
| Muy Malo | 0,4 | 1,3 | 0,9 |

$\chi^2$ = 2,740 α = ,602

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 195
## HA TENIDO QUE PAGAR POR SERVICIOS DE SALUD

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 26 | 5,7 |
| No | 433 | 94,3 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 196
## CUÁLES SERVICIOS HA TENIDO QUE PAGAR
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Consulta general | 5 | 19,2 |
| Consulta de especialista | 13 | 50,0 |
| Exámenes de laboratorio | 16 | 61,5 |
| Medicamentos IO | 4 | 15,4 |
| Otro/Especifique | 2 | 7,7 |
| Total | 40 | 153,8 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 197
## HA TENIDO QUE PAGAR SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 94 | 20,5 |
| No | 365 | 79,5 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 198**
**CUÁLES SERVICIOS HA TENIDO QUE PAGAR**
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Consulta general | 35 | 37,2 |
| Consulta de especialista | 29 | 30,9 |
| Exámenes de laboratorio | 53 | 56,4 |
| Medicamentos IO | 12 | 12,8 |
| Otro/Especifique | 11 | 11,7 |
| Total | 140 | 148,9 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# USO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El 93,7% de las personas entrevistadas asegura estar tomando medicamentos antirretrovirales al momento de la entrevista (ver cuadro # 199 y gráfico #15).

El uso de los medicamentos resulta más frecuente entre las personas con mayor tiempo de haber recibido su diagnóstico (ver cuadro #210)

No existe diferencias significativas según edad (ver cuadro #200), identidad de género (ver cuadro #201), nivel de estudios (ver cuadro #202), condición de migración (ver cuadro #203), nivel de actividad (ver cuadro #204), ocupación (ver cuadro #205), relación laboral (ver cuadro #206), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #207), hombres (ver cuadro #208) y trans (ver cuadro #209) y si tiene pareja estable (ver cuadro #211).

El medicamento se proporciona en forma gratuita y completa para el 92,8% de las personas entrevistadas (ver cuadro #212).

El tiempo desde que inició el uso de los medicamentos es muy variable, pero sobresalen aquellas personas que iniciaron hace más de 3 años (ver cuadro #213).

La variedad de medicamentos mencionados es muy grande, pero sobresalen Atripla, Efavirenz, y Lamivudina (ver cuadro #214).

El 56,2% de las personas que están tomando medicamentos antirretrovirales asegura que no ha tenido efectos adversos y otro 30,5% solo efectos livianos(ver cuadro #215).

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

Existe un 12,4% de las personas que acepta haber interrumpido el tratamiento por decisión propia en los últimos 12 meses (ver cuadro # 216 y gráfico #16).

La suspensión resulta más frecuente entre las personas que trabajan para el Gobierno (ver cuadro #223).

No existen diferencias significativas según edad (ver cuadro #217), identidad de género (ver cuadro #218), nivel de estudios (ver cuadro #219), condición de migración (ver cuadro #220), nivel de actividad (ver cuadro #221), ocupación (ver cuadro #222), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #224), hombres (ver cuadro #225) y trans (ver cuadro #226), tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #227) y si tiene pareja estable (ver cuadro #228).

Entre las principales razones para interrumpir, sobresalen los efectos secundarios, la dificultad para trasladarse y la dificultad de recordar (ver cuadro #229).

Existe, además, un 10,7% que reconoce haber dejado de tomar los medicamentos para poder ingerir alcohol u otras drogas (ver cuadro #230).

También, existe un 8,4% que acepta haber olvidado retirar sus medicamentos al menos una vez en el último año (ver cuadro #231).

A un 3,3% de las personas le han dejado de suministrar los medicamentos en el centro de salud (ver cuadro #232).

**Cuadro # 199**
**ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 430 | 93,7 |
| No | 29 | 6,3 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 200**
**ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

| | 25 o menos | De 26 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 60 | Más de 60 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 89,4 | 91,5 | 95,4 | 94,8 | 100,0 | 93,7 |
| No | 10,6 | 8,5 | 4,6 | 5,2 | | 6,3 |

$\chi^2$ = 5,132 α = ,274

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 201
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | Femenino | Masculino | Mujer trans | Hombre trans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 92,9 | 95,0 | 92,3 | 71,4 | 93,7 |
| No | 7,1 | 5,0 | 7,7 | 28,6 | 6,3 |

$\chi^2$ = 6,861 α = ,076

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 202
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | No asistió a la escuela | Alfabetizada | Primaria incompleta | Primaria completa | Secundaria incompleta | Secundaria completa | Universitaria incompleta | Universitaria completa | Post grado universitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 100,0 | 83,3 | 95,5 | 95,9 | 100,0 | 95,4 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 96,2 |
| No | | 16,7 | 4,5 | 4,1 | | 4,6 | | 12,5 | | 3,8 |

$\chi^2$ = 8,510 α = ,385

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 203
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | Migró dentro del país | Migró a otro país | No migró | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 97,1 | 100,0 | 92,6 | 93,7 |
| No | 2,9 | | 7,4 | 6,3 |

$\chi^2$ = 2,889 α = ,236

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 204
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | Solo trabaja | Estudia y trabaja | Está desempleado | Es pensionado | Recibe Remesas | Solo estudia | Solo se dedica a tareas del hogar | No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 96,3 | 94,1 | 91,0 | 75,0 | 88,9 | 88,9 | 93,8 | 80,0 | 93,7 |
| No | 3,7 | 5,9 | 9,0 | 25,0 | 11,1 | 11,1 | 6,2 | 20,0 | 6,3 |

$\chi^2$ = 10,603 α = ,157

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 205
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | Profesional | Técnico medio | Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | Calificadas de industrias, construcción y operación | No calificadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 90,9 | 100,0 | 95,1 | 92,0 | 100,0 | 96,3 | 96,1 |
| No | 9,1 | | 4,9 | 8,0 | | 3,7 | 3,9 |

$\chi^2$ = 3,898 α = ,564

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 206
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | No remunerado | Empleado del Gobierno o Institución | Empleado de Organización No Gubernamental | Empleado de empresa privada | Servicio doméstico | Cuenta propia | Patrono con menos de 10 empleados | Patrono con 10 o más empleados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 96,8 | 100,0 | 97,1 | 87,5 | 85,7 | 96,1 |
| No | | 25,0 | | 3,2 | | 2,9 | 12,5 | 14,3 | 3,9 |

$\chi^2$ = 11,833 α = ,106

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 207
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Solo practica el sexo con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,8 |
| No | 5,4 | | | | 5,2 |

$\chi^2$ = ,226 α = ,973

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 208
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Solo practica el sexo con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 96,5 |
| No | 2,8 | | | | 4,5 | 3,5 |

$\chi^2$ = 1,341 α = ,854

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 209
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 87,5 | 100,0 | 100,0 | | 84,2 |
| No | 12,5 | | | 100,0 | 15,8 |

$\chi^2$ = 5,839 α = ,120

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 210
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | Menos de 1 mes | De 1 a 5 meses | De 6 a 11 meses | De 1 o 2 años | De 3 a 5 años | De 6 a 10 años | Más de 10 años | No recuerda | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 50,0 | 58,8 | 80,0 | 91,5 | 95,1 | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 93,7 |
| No | 50,0 | 41,2 | 20,0 | 8,5 | 4,9 | 4,2 | | | 6,3 |

$\chi^2$ = 64,399 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 211
## ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES SEGÚN ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | Sí | No | Total |
|---|---|---|---|
| Sí | 95,7 | 92,0 | 93,9 |
| No | 4,3 | 8,0 | 6,1 |

$\chi^2$ = 2,742 α = ,098

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 212
## CÓMO LE PROPORCIONAN SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Todos los medicamentos en forma gratuita | 398 | 92,8 |
| Todos los medicamentos, pero no todos gratuitos | 25 | 5,8 |
| No todos los medicamentos, pero los que dan son gratis | 6 | 1,4 |
| Total | 429 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 1 |
| No está tomando antirretrovirales | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 213
## HACE CUÁNTO TIEMPO EMPEZÓ A TOMAR ANTIRRETROVIRALES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | ,9 |
| De 1 a 5 meses | 14 | 3,3 |
| De 6 a 11 meses | 22 | 5,2 |
| De 1 o 2 años | 78 | 18,3 |
| De 3 a 5 años | 104 | 24,4 |
| De 6 a 10 años | 111 | 26,0 |
| Más de 10 años | 94 | 22,0 |
| Total | 427 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 3 |
| No está tomando antirretrovirales | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 214
## CUÁLES MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES TOMA
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Atripla | 146 | 34,4 |
| Efavirenz | 91 | 21,4 |
| Lamivudina | 53 | 12,5 |
| Truvada | 49 | 11,5 |
| Tenofovir | 45 | 10,6 |
| Nevirapina | 27 | 6,4 |
| Emtricitabina | 13 | 3,1 |
| Zidovudina | 8 | 1,9 |
| Didanosina | 6 | 1,4 |
| Estavudina | 5 | 1,2 |
| Lopinavir | 4 | 0,9 |
| Ritonavir | 3 | 0,7 |
| Otros | 74 | 17,4 |
| No Sabe | 59 | 13,9 |
| Total | 583 | 137,2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 215
## HA TENIDO EFECTOS ADVERSOS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| No | 241 | 56,2 |
| Sí, pero livianos | 131 | 30,5 |
| Sí, en forma moderada | 42 | 9,8 |
| Sí, en forma severa | 15 | 3,5 |
| Total | 429 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta, | | 1 |
| No está tomando antirretrovirales | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 216
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 53 | 12,4 |
| No | 376 | 87,6 |
| Total | 429 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |
| No está tomando antirretrovirales | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 217
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | 25 o menos | De 26 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 60 | Más de 60 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 11,9 | 12,5 | 14,5 | 12,1 | | 12,4 |
| No | 88,1 | 87,5 | 85,5 | 87,9 | 100,0 | 87,6 |

$\chi^2$ = 3,865 α = ,425

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 218
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | Femenino | Masculino | Mujer trans | Hombre trans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 12,6 | 11,4 | 16,7 | 40,0 | 12,4 |
| No | 87,4 | 88,6 | 83,3 | 60,0 | 87,6 |

$\chi^2$ = 3,955 α = ,266

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 219
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | No asistió a la escuela | Alfabetizada | Primaria incompleta | Primaria completa | Secundaria incompleta | Secundaria completa | Universitaria incompleta | Universitaria completa | Post grado universitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | | | 14,2 | 7,1 | 13,2 | 9,7 | 6,1 | 28,6 | 100,0 | 10,9 |
| No | 100,0 | 100,0 | 85,8 | 92,9 | 86,8 | 90,3 | 93,9 | 71,4 | | 89,1 |

$\chi^2$ = 15,132 α = ,057

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 220
## USPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | Migró dentro del país | Migró a otro país | No migró | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 17,3 | | 11,0 | 12,4 |
| No | 82,7 | 100,0 | 89,0 | 87,6 |

$\chi^2$ = 3,366 α = ,186

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 221
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | Solo trabaja | Estudia y trabaja | Está desempleado | Es pensionado | Recibe Remesas | Solo estudia | Solo se dedica a tareas del hogar | No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 10,7 | 12,5 | 16,5 | 16,7 | 12,5 | | 11,1 | 25,0 | 12,1 |
| No | 89,3 | 87,5 | 83,5 | 83,3 | 87,5 | 100,0 | 88,9 | 75,0 | 87,9 |

$\chi^2$ = 3,921 α = ,789

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 222
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | Profesional | Técnico medio | Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | Calificadas de industrias, construcción y operación | No calificadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 10,0 | 6,2 | 15,4 | 4,3 | 15,4 | 11,5 | 10,9 |
| No | 90,0 | 93,8 | 84,6 | 95,7 | 84,6 | 88,5 | 89,1 |

$\chi^2$ = 2,867 α = ,720

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 223
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | No remunerado | Empleado del Gobierno o Institución | Empleado de Organización No Gubernamental | Empleado de empresa privada | Servicio doméstico | Cuenta propia | Patrono con menos de 10 empleados | Patrono con 10 o más empleados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 27,3 | 66,7 | 18,2 | 4,9 | 13,3 | 10,0 | 7,1 | 16,7 | 10,9 |
| No | 72,7 | 33,3 | 81,8 | 95,1 | 86,7 | 90,0 | 92,9 | 83,3 | 89,1 |

$\chi^2$ = 16,127 α = ,024

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 224
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Solo practica el sexo con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 16,0 | 100,0 | | | 16,4 |
| No | 84,0 | | 100,0 | 100,0 | 83,6 |

$\chi^2$ = 5,706 α = ,127

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 225
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | Solo practica el sexo con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | 17,1 | 22,2 | | 10,0 | 8,6 | 10,8 |
| No | 82,9 | 77,8 | 100,0 | 90,0 | 91,4 | 89,2 |

$\chi^2$ = 4,061 α = ,398

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 226
## A SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | Solo practica el sexo con hombres | Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 28,6 | | | 25,0 |
| No | 71,4 | 100,0 | 100,0 | 75,0 |

$\chi^2$ = ,762 α = ,683

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 227
## HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | Menos de 1 mes | De 1 a 5 meses | De 6 a 11 meses | De 1 o 2 años | De 3 a 5 años | De 6 a 10 años | Más de 10 años | No recuerda | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | | | 6,2 | 7,7 | 10,2 | 15,9 | 14,8 | 33,3 | 12,4 |
| No | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 92,3 | 89,8 | 84,1 | 85,2 | 66,7 | 87,6 |

$\chi^2$ = 7,167 α = ,412

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 228
## NTINGENCIA HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | Sí | No | Total |
|---|---|---|---|
| Sí | 12,6 | 12,1 | 12,4 |
| No | 87,4 | 87,9 | 87,6 |

$\chi^2$ = ,028 α = ,866

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 229
## RAZONES DE INTERRUPCIÓN
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Causan efectos secundarios | 11 | 21,6 |
| Por dificultades para trasladarme por la inseguridad | 11 | 21,6 |
| Es difícil recordar | 10 | 19,6 |
| He faltado a mis citas médicas | 8 | 15,7 |
| Por cansancio | 5 | 9,8 |
| Es difícil / complicado tomarlo | 4 | 7,8 |
| Por el costo | 3 | 5,9 |
| Por recomendación de mi iglesia | 1 | 2,0 |
| Otro | 9 | 17,6 |
| Total | 62 | 121,6 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en El Salvador, REDCA+, 2017

## Cuadro # 230
## HA DEJADO DE TOMAR MEDICAMENTOS PARA INGERIR ALCOHOL U OTRAS DROGAS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 46 | 10,7 |
| No | 383 | 89,3 |
| Total | 429 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |
| No está tomando antirretrovirales | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 231
## HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 36 | 8,4 |
| No | 392 | 91,6 |
| Total | 428 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 2 |
| No está tomando antirretrovirales | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 232
## LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 14 | 3,3 |
| No | 416 | 96,7 |
| Total | 430 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No está tomando antirretrovirales | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

La percepción que tienen las personas entrevistadas sobre los medicamentos antirretrovirales resulta en general bastante positiva, con un promedio de 84,6 y con una variabilidad relativamente baja entre las personas, con una desviación estándar de 18,3 (ver cuadro # 233 y gráfico #17).

El 70,4% de las personas entrevistadas presenta una percepción muy positiva, mientras que ninguna persona muestra una actitud muy negativa (ver cuadro #234).

La percepción resulta más positiva entre las personas que laboran en empresa privada o en servicios domésticos (ver cuadro #241), las que tienen mayor tiempo de haber recibido su diagnóstico (ver cuadro #245), y entre las personas con una visión mejor de su salud (ver cuadro #246).

La percepción no varía significativamente según edad (ver cuadro #235), identidad de género (ver cuadro #236), la condición de migración (ver cuadro #238) nivel de actividad (ver cuadro

#239), ocupación (ver cuadro #240), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #242), los hombres (ver cuadro #243) y trans (ver cuadro #244) y si tiene pareja estable (ver cuadro #247).

Específicamente, el 85,6% opina que una persona que toma antirretrovirales se enferma menos (ver cuadro #248), un 71,1% opina que vive más (ver cuadro #249) y un 66% que tiene menos probabilidad de transmitir el VIH (ver cuadro #250).

**Cuadro # 233**
**PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES**
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 33,33 | 100,00 | 84,5926 | 18,26811 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 234**
**PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Medio mala | 50 | 11,1 |
| Medio buena | 83 | 18,4 |
| Muy buena | 317 | 70,4 |
| Total | 450 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| Sistema | | 9 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 235
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 46 | 83,6957 | 20,93173 |
| De 26 a 35 | 138 | 82,6087 | 19,40619 |
| De 36 a 45 | 147 | 86,3946 | 17,11947 |
| De 46 a 60 | 96 | 85,0694 | 16,83757 |
| Más de 60 | 23 | 84,7826 | 18,74405 |
| Total | 450 | 84,5926 | 18,26811 |

F = ,808 α = ,521

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 236
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 195 | 84,8718 | 17,35431 |
| Masculino | 235 | 84,9645 | 18,44980 |
| Mujer trans | 13 | 83,3333 | 24,53267 |
| Hombre trans | 7 | 66,6667 | 19,24501 |
| Total | 450 | 84,5926 | 18,26811 |

F = 2,336 α = ,073

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 237
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 75,0000 | 17,48015 |
| Alfabetizada | 6 | 94,4444 | 13,60828 |
| Primaria incompleta | 111 | 81,5315 | 20,14485 |
| Primaria completa | 71 | 87,0892 | 18,08208 |
| Secundaria incompleta | 51 | 87,5817 | 14,84855 |
| Secundaria completa | 105 | 89,5238 | 15,02440 |
| Universitaria incompleta | 33 | 88,3838 | 17,42287 |
| Universitaria completa | 8 | 85,4167 | 18,76653 |
| Post grado universitario | 1 | 83,3333 | , |
| Total | 392 | 86,2245 | 17,64406 |

F = 2,078 α = ,037

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 238
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 100 | 86,5000 | 15,65893 |
| Migró a otro país | 4 | 70,8333 | 8,33333 |
| No migró | 346 | 84,2004 | 18,97247 |
| Total | 450 | 84,5926 | 18,26811 |

F = 1,765 α = ,172

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 239
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 209 | 84,4498 | 19,30490 |
| Estudia y trabaja | 17 | 84,3137 | 14,98910 |
| Está desempleado | 97 | 87,2852 | 16,45230 |
| Es pensionado | 8 | 85,4167 | 20,77372 |
| Recibe Remesas | 9 | 77,7778 | 20,41241 |
| Solo estudia | 9 | 88,8889 | 18,63390 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 95 | 83,5088 | 17,44541 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 60,0000 | 9,12871 |
| Total | 449 | 84,5583 | 18,27396 |

F = 1,924 α = ,064

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 240
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 10 | 81,6667 | 19,95365 |
| Técnico medio | 32 | 85,9375 | 15,90145 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 82,9268 | 19,89130 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 84,0000 | 18,92969 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 12 | 86,1111 | 19,89027 |
| No calificadas | 106 | 84,7484 | 19,66894 |
| Total | 226 | 84,4395 | 18,98682 |

F = ,158 α = ,977

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 241
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 68,0556 | 24,05626 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 83,3333 | 23,57023 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 84,8485 | 13,85349 |
| Empleado de empresa privada | 61 | 89,6175 | 14,64517 |
| Servicio doméstico | 14 | 89,2857 | 12,41577 |
| Cuenta propia | 102 | 84,3137 | 19,73749 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 15 | 75,5556 | 24,28883 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 78,5714 | 18,54495 |
| Total | 226 | 84,4395 | 18,98682 |

F = 2,767 α = ,009

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 242
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 86,1607 | 17,02151 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 66,6667 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 100,0000 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 100,0000 | ,00000 |
| Total | 116 | 86,3506 | 16,96816 |

F = 1,103 α = ,351

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 243
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 34 | 85,2941 | 16,29107 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 94,4444 | 11,78511 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 88,0952 | 18,54495 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 88,3333 | 17,65583 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 108 | 87,5000 | 17,66849 |
| Total | 168 | 87,5000 | 17,08555 |

F = ,515 α = ,724

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 244
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 77,0833 | 24,24795 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 100,0000 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 100,0000 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 50,0000 | , |
| Total | 19 | 78,0702 | 24,24962 |

F = 1,001 α = ,420

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 245
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 66,6667 | 23,57023 |
| De 1 a 5 meses | 16 | 71,8750 | 22,54111 |
| De 6 a 11 meses | 18 | 70,3704 | 18,57290 |
| De 1 o 2 años | 70 | 87,6190 | 19,79885 |
| De 3 a 5 años | 101 | 86,3036 | 17,38391 |
| De 6 a 10 años | 116 | 87,6437 | 16,01942 |
| Más de 10 años | 122 | 83,1967 | 17,60394 |
| No recuerda | 3 | 72,2222 | 9,62250 |
| Total | 450 | 84,5926 | 18,26811 |

F = 4,626 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 246
## PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 86,9464 | 16,91596 |
| Bueno | 178 | 84,8315 | 18,43542 |
| Estable | 101 | 83,4983 | 18,33258 |
| Malo | 23 | 77,5362 | 19,85344 |
| Muy Malo | 4 | 66,6667 | 27,21655 |
| Total | 449 | 84,6696 | 18,21515 |

F = 2,560 α = ,038

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 247**
**PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES**
**SEGÚN ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE**

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 229 | 85,5895 | 17,82535 |
| No | 220 | 83,7121 | 18,60448 |

t = 1,092 α = ,275

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 248
## UNA PERSONA CON ANTIRRETROVIRALES, SE ENFERMA MENOS, IGUAL O MÁS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Se enferma menos | 392 | 85,6 |
| Se enferma igual | 34 | 7,4 |
| Se enferma más | 8 | 1,7 |
| No sabe | 24 | 5,2 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 249
## UNA PERSONA CON ANTIRRETROVIRALES, VIVE MENOS, IGUAL O MÁS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Vive menos | 23 | 5,0 |
| Vive igual | 73 | 16,0 |
| Vive más | 325 | 71,1 |
| No sabe | 36 | 7,9 |
| Total | 457 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 250
## CON MEDICAMENTOS, TIENE MENOS, IGUAL O MÁS PROBABILIDAD DE TRANSMITIR EL VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Menos probabilidad | 299 | 66,0 |
| Igual probabilidad | 52 | 11,5 |
| Más probabilidad | 38 | 8,4 |
| No sabe | 64 | 14,1 |
| Total | 453 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 6 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# EXÁMENES DE LABORATORIO

Un 95,6% de las personas afirma haberse realizado el examen CD4 en los últimos 12 meses (ver cuadro #251).

El 74,7% conoce los resultados del mismo (ver cuadro #252), en donde predomina un recuento entre 501 y 1000 (ver cuadro #253).

En lo que respecta al examen de carga viral, el 94,3% afirma habérselo realizado en los últimos 12 meses (ver cuadro #254) y un 70,7% conoce los resultados (ver cuadro #255), predominando la condición de indetectable (ver cuadro #256).

**Cuadro # 251**
**SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 435 | 95,6 |
| No | 20 | 4,4 |
| Total | 455 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 4 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 252**
**CONOCE LOS RESULTADOS DE SU ÚLTIMO EXAMEN CD4**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 322 | 74,7 |
| No | 109 | 25,3 |
| Total | 431 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 4 |
| No se ha realizado el examen | | 24 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 253
## CUÁNTO FUE EL RECUENTO DE CD4

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Menos de 100 | 8 | 2,5 |
| De 101 a 300 | 21 | 6,5 |
| De 301 a 500 | 53 | 16,5 |
| De 501 a 750 | 112 | 34,9 |
| De 750 a 1000 | 63 | 19,6 |
| Más de 1000 | 19 | 5,9 |
| No recuerda | 45 | 14,0 |
| Total | 321 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 1 |
| No se ha realizado el examen | | 24 |
| No conoce los resultados | | 113 |
| No recuerda | | |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 254
## SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 429 | 94,3 |
| No | 26 | 5,7 |
| Total | 455 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 4 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 255
## CONOCE LOS RESULTADOS DE SU ÚLTIMO EXAMEN DE CARGA VIRAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 299 | 70,7 |
| No | 124 | 29,3 |
| Total | 423 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 6 |
| No se ha realizado el examen | | 30 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 256
## CUÁL FUE EL RECUENTO DE CARGA VIRAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Indetectable | 242 | 80,9 |
| Menos de 10000 | 18 | 6,0 |
| Más de 10000 | 12 | 4,0 |
| No recuerda | 27 | 9,0 |
| Total | 299 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No se ha realizado el examen | | 30 |
| No conoce los resultados | | 130 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y HEPATITIS

Solo un 24,8% de las personas entrevistadas dice haber recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis (ver cuadro #257).

Sin embargo, solamente un 11,3% se enfermado de tuberculosis (ver cuadro #258) y el 98% de estas personas ha recibido tratamiento para curarla (ver cuadro #259).

En lo que respecta a la hepatitis B, solo un 17,6% afirma haber recibido orientación para prevenirla (ver cuadro #260).

Por otra parte, solo un 2,2% se ha enfermando de hepatitis B.

**Cuadro # 257**
**HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 109 | 24,8 |
| No | 330 | 75,2 |
| Total | 439 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 20 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 258**
**SE HA ENFERMADO DE TUBERCULOSIS**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 51 | 11,3 |
| No | 401 | 88,7 |
| Total | 452 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 7 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 259
## HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA CURAR LA TUBERCULOSIS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 50 | 98,0 |
| No | 1 | 2,0 |
| Total | 51 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No se ha enfermado de tuberculosis | | 408 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 260
## HA RECIBIDO ORIENTACIÓN PARA PREVENIR LA HEPATITIS B

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 78 | 17,6 |
| No | 364 | 82,4 |
| Total | 442 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 17 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 261
## SE HA ENFERMADO DE HEPATITIS B

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 10 | 2,2 |
| No | 439 | 97,8 |
| Total | 449 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 10 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# VICTIMIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El nivel de victimización por estigma y discriminación asociadas a la condición de ser una persona con VIH tiende a ser relativamente bajo, con un promedio de 15,3 en una escala de 0 a 100, aunque con una variabilidad importante de un sujeto a otro, puesto que la desviación estándar es superior al promedio (16,7) (ver cuadro #262).

El 83% de las personas entrevistadas muestra un nivel muy bajo de victimización, mientras que solamente un 1,7% muestra un nivel muy alto (ver cuadro # 263 y gráfico #18).

La victimización tiende a ser superior entre las personas de menor edad (ver cuadro #264), los hombres trans (ver cuadro #265), entre las personas inactivas (ver cuadro #268), las que laboran en puestos de apoyo administrativo (ver cuadro #269), la percepción negativa del estado de salud (ver cuadro #275) y la actividad sexual entre los hombres (ver cuadro #272),

No existen diferencias significativas en el nivel de victimización según nivel de estudios (ver cuadro #266), condición de migración (ver cuadro #267), relación laboral (ver cuadro #270), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #271) y trans (ver cuadro #273), tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #274) y si tiene pareja estable (ver cuadro #276).

El nivel mayor de victimización corresponde a situaciones de ofrecimiento de favores o regalos a cambio de tener relaciones sexuales, seguido por la presión para tener relaciones sexuales sin preservativo (ver cuadro #277).

Por otra parte, un 7,8% de las personas afirma que ha sido víctima de algún maltrato en los servicios de salud (ver cuadro #278) y un 25,9% considera necesario ocultar en los servicios de salud que es una Persona con VIH (ver cuadro #279).

Del mismo modo, a un 11,6% le han obligado a realizarse el examen del VIH por motivos de trabajo (ver cuadro #280).

Menos de una cuarta parte de las familias de las personas entrevistadas desconoce el diagnóstico de VIH (ver cuadro #281). Entre las otras tres cuartas partes, la reacción de la familia fue en su gran mayoría de apoyo (ver cuadro #282).

Más de dos terceras partes de las personas entrevistadas afirman que denunciarían un acto de violación a sus derechos (ver cuadro #283). Entre las personas que no lo harían, la principal justificación se asocia con la sensación de que al hacerlo se darían cuenta que es una persona VIH y que al final no se ganaría nada (ver cuadro #284).

**Cuadro # 262**
**VICTIMIZACIÓN**
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | ,00 | 88,89 | 15,2869 | 16,70642 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 263**
**VICTIMIZACIÓN**

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy baja | 381 | 83,0 |
| Medio baja | 55 | 12,0 |
| Medio alta | 15 | 3,3 |
| Muy alta | 8 | 1,7 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 264
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 19,8582 | 19,78632 |
| De 26 a 35 | 141 | 16,6667 | 17,02006 |
| De 36 a 45 | 152 | 14,0716 | 14,91148 |
| De 46 a 60 | 96 | 14,8148 | 18,34027 |
| Más de 60 | 23 | 7,4879 | 6,17930 |
| Total | 459 | 15,2869 | 16,70642 |

F = 2,630 α = ,034

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 265
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 197 | 16,0462 | 17,08444 |
| Masculino | 242 | 12,6033 | 12,82106 |
| Mujer trans | 13 | 31,6239 | 29,60514 |
| Hombre trans | 7 | 56,3492 | 23,66357 |
| Total | 459 | 15,2869 | 16,70642 |

F = 23,468 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 266
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 6,4815 | 6,49470 |
| Alfabetizada | 6 | 9,2593 | 9,07218 |
| Primaria incompleta | 112 | 14,8313 | 17,54268 |
| Primaria completa | 73 | 13,5464 | 15,12937 |
| Secundaria incompleta | 53 | 13,2075 | 12,90196 |
| Secundaria completa | 108 | 15,9465 | 16,20319 |
| Universitaria incompleta | 33 | 17,5084 | 18,58836 |
| Universitaria completa | 8 | 25,0000 | 24,48770 |
| Post grado universitario | 1 | 11,1111 | , |
| Total | 400 | 14,8889 | 16,24844 |

F = ,982 α = ,449

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 267
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 102 | 15,7407 | 18,21860 |
| Migró a otro país | 4 | 29,1667 | 28,46375 |
| No migró | 353 | 14,9984 | 16,08347 |
| Total | 459 | 15,2869 | 16,70642 |

F = 1,474 α = ,230

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 268
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 14,3302 | 16,48813 |
| Estudia y trabaja | 17 | 24,1830 | 25,30228 |
| Está desempleado | 100 | 14,8889 | 14,79123 |
| Es pensionado | 8 | 8,3333 | 5,14344 |
| Recibe Remesas | 9 | 19,7531 | 10,05813 |
| Solo estudia | 9 | 24,6914 | 23,42428 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 13,7731 | 14,39666 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 45,5556 | 35,00441 |
| Total | 458 | 15,2475 | 16,70332 |

F = 4,143 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 269
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 12,6263 | 13,40050 |
| Técnico medio | 33 | 13,2997 | 16,72094 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 22,4932 | 22,59927 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 7,5556 | 6,58905 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 12,3932 | 9,66354 |
| No calificadas | 108 | 15,0720 | 17,40409 |
| Total | 231 | 15,0553 | 17,40540 |

F = 2,692 α = ,022

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 270
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 19,4444 | 23,86597 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 19,4444 | 17,27292 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 17,1717 | 23,23452 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 13,5802 | 13,88988 |
| Servicio doméstico | 15 | 17,4074 | 19,34403 |
| Cuenta propia | 103 | 15,4261 | 18,94283 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 10,0694 | 9,34451 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 15,8730 | 13,00070 |
| Total | 231 | 15,0553 | 17,40540 |

F = ,461 α = ,862

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 271
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 17,5099 | 18,37598 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 11,1111 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 33,3333 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 19,4444 | 3,92837 |
| Total | 116 | 17,6245 | 18,12872 |

F = ,296 α = ,828

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 272
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 20,0617 | 17,17622 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 15,4321 | 12,03704 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 23,8095 | 18,62404 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 20,5556 | 15,05591 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 111 | 11,4615 | 11,49048 |
| Total | 173 | 14,4830 | 13,90356 |

F = 4,349 α = ,002

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 273
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 35,0694 | 29,65638 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 83,3333 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 61,1111 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 33,3333 | , |
| Total | 19 | 38,8889 | 29,74515 |

F = 1,036 α = ,405

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 274
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 19,4444 | 13,22487 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 19,9346 | 17,35376 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 17,2222 | 20,70085 |
| De 1 o 2 años | 71 | 18,6228 | 18,42805 |
| De 3 a 5 años | 103 | 13,1068 | 11,16150 |
| De 6 a 10 años | 118 | 15,7721 | 17,50760 |
| Más de 10 años | 123 | 13,6405 | 17,77226 |
| No recuerda | 3 | 14,8148 | 25,66001 |
| Total | 459 | 15,2869 | 16,70642 |

F = 1,104 α = ,360

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 275
## VICTIMIZACIÓN
## SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 13,0925 | 13,55074 |
| Bueno | 183 | 14,8452 | 16,44298 |
| Estable | 105 | 17,3016 | 18,55912 |
| Malo | 23 | 18,1159 | 19,04108 |
| Muy Malo | 4 | 41,6667 | 38,62343 |
| Total | 458 | 15,2596 | 16,71445 |

F = 3,774 α = ,005

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 276**
**VICTIMIZACIÓN**
## SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 15,4983 | 15,85128 |
| No | 225 | 15,0370 | 17,60988 |

t = ,295 α = ,768

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

**Cuadro # 277**
**SITUACIONES DE VICTIMIZACIÓN**

| | Sí | No |
|---|---|---|
| ¿Ha aceptado usted tener relaciones sexuales sin desearlas por miedo a posibles represalias? | 11,5 | 88,5 |
| ¿Le han ofrecido alguna vez dinero, ropa, trabajo u otros favores o privilegios a cambio de tener relaciones sexuales? | 19,6 | 80,4 |
| ¿La/lo han amenazado con quitarle trabajo, privilegios o derechos si no tiene relaciones sexuales? | 4,6 | 95,4 |
| ¿La/lo han forzado físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad? | 9,6 | 90,4 |
| ¿La/lo han agredido físicamente durante el desarrollo de una relación sexual? | 7,9 | 92,1 |
| ¿La/lo han presionado para tener relaciones sexuales sin preservativo? | 11,1 | 88,9 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 278
## HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN TIPO DE MALTRATO EN LOS SERVICIOS DE SALUD

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 36 | 7,8 |
| No | 423 | 92,2 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 279
## CONSIDERA NECESARIO OCULTAR QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Siempre | 114 | 25,9 |
| A veces | 227 | 51,5 |
| Nunca | 100 | 22,7 |
| Total | 441 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 18 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 280
## LE HAN OBLIGADO A REALIZARSE EL EXAMEN DE VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 53 | 11,6 |
| No | 405 | 88,4 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 281
## SU FAMILIA SABE QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 362 | 78,9 |
| No | 97 | 21,1 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 282
## QUÉ HIZO SU FAMILIA CUANDO SE ENTERÓ DE SU DIAGNÓSTICO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Me apoyaron | 317 | 88,1 |
| Me rechazaron | 18 | 5,0 |
| Me abandonaron | 3 | ,8 |
| Me expulsaron del hogar | 4 | 1,1 |
| Otros/Especifique | 18 | 5,0 |
| Total | 360 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 2 |
| No conocen diagnóstico | | 97 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 283
## DENUNCIARÍA USTED UN ACTO DE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 312 | 68,1 |
| No | 64 | 14,0 |
| No Sabe | 82 | 17,9 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 284
## POR QUÉ NO DENUNCIARÍA
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Se darían cuenta que soy una persona con VIH | 27 | 42,9 |
| No cambiaría nada con hacerlo | 23 | 36,5 |
| Para proteger a mi familia | 12 | 19,0 |
| Falta de confianza en el sistema | 12 | 19,0 |
| No tiene tiempo | 7 | 11,1 |
| No sabe cómo hacerlo | 6 | 9,5 |
| Otros/Especifique | 5 | 7,9 |
| Total | 92 | 146,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# RIESGO EN RELACIONES SEXUALES

El nivel de riesgo en las relaciones sexuales resulta moderadamente bajo, con un promedio de 27,5 en una escala de 0 a 100 y con una variabilidad de 14,3 (ver cuadro #285).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

Un 58% de las personas muestran un nivel muy bajo de riesgo y un 33,1% se ubica en un nivel medio bajo, mientras que solo un 0,9% alcanza un nivel muy alto (ver cuadro # 286 y gráfico #19).

El riesgo resulta significativamente superior entre los hombres trans (ver cuadro #288), entre las personas inactivas (ver cuadro #291), el personal de apoyo administrativo (ver cuadro #292) y entre las que no tienen una pareja estable (ver cuadro #299).

El riesgo no varía según edad (ver cuadro #287), nivel de estudios (ver cuadro #289), condición de migración (ver cuadro #290), relación laboral (ver cuadro #293), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #294), hombres (ver cuadro #295) y trans (ver cuadro #296), el tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #297) y la percepción del estado de salud (ver cuadro #298).

## Cuadro # 285
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 13,20 | 86,80 | 27,5081 | 14,29161 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 286
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy bajo | 266 | 58,0 |
| Medio bajo | 152 | 33,1 |
| Medio alto | 37 | 8,1 |
| Muy alto | 4 | ,9 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 287
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES
## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 29,4298 | 12,39067 |
| De 26 a 35 | 141 | 26,0511 | 14,59985 |
| De 36 a 45 | 152 | 26,5947 | 13,94783 |
| De 46 a 60 | 96 | 29,1042 | 14,64752 |
| Más de 60 | 23 | 31,8870 | 15,95321 |
| Total | 459 | 27,5081 | 14,29161 |

F = 1,581 α = ,178

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 288
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 197 | 23,2010 | 9,30441 |
| Masculino | 242 | 29,7364 | 15,38129 |
| Mujer trans | 13 | 41,9846 | 23,02093 |
| Hombre trans | 7 | 44,8000 | 24,25064 |
| Total | 459 | 27,5081 | 14,29161 |

F = 17,493 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 289
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 23,4000 | 3,72451 |
| Alfabetizada | 6 | 24,4667 | 8,08125 |
| Primaria incompleta | 112 | 28,3143 | 17,17901 |
| Primaria completa | 73 | 27,4822 | 13,74582 |
| Secundaria incompleta | 53 | 29,6792 | 15,56388 |
| Secundaria completa | 108 | 27,5481 | 13,16081 |
| Universitaria incompleta | 33 | 29,7697 | 14,84959 |
| Universitaria completa | 8 | 23,3500 | 7,21645 |
| Post grado universitario | 1 | 20,0000 | , |
| Total | 400 | 28,0050 | 14,68575 |

F = ,426 α = ,905

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 290
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 102 | 28,4863 | 16,55262 |
| Migró a otro país | 4 | 23,4000 | 3,92598 |
| No migró | 353 | 27,2720 | 13,65594 |
| Total | 459 | 27,5081 | 14,29161 |

F = ,451 α = ,637

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 291
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 30,4262 | 15,77791 |
| Estudia y trabaja | 17 | 31,1882 | 17,30874 |
| Está desempleado | 100 | 26,2580 | 12,14725 |
| Es pensionado | 8 | 28,7500 | 21,31391 |
| Recibe Remesas | 9 | 32,6222 | 14,60392 |
| Solo estudia | 9 | 24,4222 | 10,03915 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 20,7833 | 7,07777 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 40,0800 | 27,10483 |
| Total | 458 | 27,5245 | 14,30292 |

F = 5,748 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 292
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 22,4000 | 11,34055 |
| Técnico medio | 33 | 33,5455 | 16,38385 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 35,9073 | 17,97454 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 26,7760 | 14,12165 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 33,3385 | 17,67623 |
| No calificadas | 108 | 28,8241 | 14,82336 |
| Total | 231 | 30,4823 | 15,85633 |

F = 2,446 α = ,035

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 293
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 28,2667 | 21,14613 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 28,3500 | 11,44771 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 35,0727 | 21,55649 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 29,5714 | 13,95582 |
| Servicio doméstico | 15 | 28,4800 | 12,05720 |
| Cuenta propia | 103 | 32,4214 | 16,46501 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 22,9125 | 12,46135 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 29,5429 | 18,46283 |
| Total | 231 | 30,4823 | 15,85633 |

F = ,983 α = ,444

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 294
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 23,3911 | 9,87808 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 46,8000 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 26,8000 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 26,8000 | ,00000 |
| Total | 116 | 23,6810 | 9,95821 |

F = 1,975 α = ,122

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 295
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 32,6333 | 16,63020 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 26,6444 | 12,91037 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 26,6286 | 12,79501 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 33,0000 | 16,19739 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 111 | 28,4252 | 14,28622 |
| Total | 173 | 29,4000 | 14,77363 |

F = ,837 α = ,503

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 296
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 42,0500 | 21,48767 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 80,0000 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 66,6000 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 20,0000 | , |
| Total | 19 | 44,1789 | 22,81422 |

F = 1,764 α = ,197

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 297
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 25,1000 | 3,40000 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 28,4706 | 11,92664 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 22,9900 | 8,52377 |
| De 1 o 2 años | 71 | 29,6592 | 17,09531 |
| De 3 a 5 años | 103 | 25,5456 | 13,31866 |
| De 6 a 10 años | 118 | 26,7983 | 14,60623 |
| Más de 10 años | 123 | 29,3463 | 14,10702 |
| No recuerda | 3 | 24,4000 | 13,93126 |
| Total | 459 | 27,5081 | 14,29161 |

F = 1,176 α = ,315

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 298
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES
## SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 25,7133 | 12,57864 |
| Bueno | 183 | 27,6929 | 15,18772 |
| Estable | 105 | 29,7467 | 15,02706 |
| Malo | 23 | 25,9826 | 11,49892 |
| Muy Malo | 4 | 33,4000 | 22,49622 |
| Total | 458 | 27,5096 | 14,30720 |

F = 1,454 α = ,215

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 299
## RIESGO EN RELACIONES SEXUALES
## SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 22,8275 | 12,21178 |
| No | 225 | 32,3582 | 14,72228 |

t = -7,527 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# USO DEL CONDÓN

El indicador que resume la información acerca del uso del condón presenta un nivel moderado, con un promedio de 63,6 en una escala de 0 a 100 y con una desviación estándar relativamente baja, con un valor de 11 (ver cuadro #300).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

Solamente un 0,2% muestra un nivel muy bajo en el indicador del uso del condón, aunque también solamente un 8,1% se ubica en un nivel muy alto. La mayor proporción (75,4%) se ubica en un nivel medio alto (ver cuadro # 301 y gráfico #20).

El uso del condón es significativamente inferior entre las mujeres trans (ver cuadro #303), las personas sin educación formal (ver cuadro #304), las que han migrado a otro país (ver cuadro #305), entre las personas que trabajan en servicios domésticos (ver cuadro #308), las mujeres que practican sexo tanto con hombres como con mujeres (ver cuadro #309), las que tienen menor tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #312), las que perciben su estado de salud como malo (ver cuadro #313) y las que no tienen una pareja estable (ver cuadro #314).

No existen diferencias significativas según edad (ver cuadro #302), nivel de actividad (ver cuadro #306), ocupación (ver cuadro #307), actividad sexual entre los hombres (ver cuadro #310) y trans (ver cuadro #311).

## Cuadro # 300
## USO DEL CONDÓN
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 25,00 | 93,33 | 63,6415 | 10,97717 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 301
## USO DEL CONDÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy bajo | 1 | ,2 |
| Medio bajo | 75 | 16,3 |
| Medio alto | 346 | 75,4 |
| Muy alto | 37 | 8,1 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 302
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 63,8298 | 11,27669 |
| De 26 a 35 | 141 | 64,6345 | 10,63891 |
| De 36 a 45 | 152 | 63,7504 | 11,16307 |
| De 46 a 60 | 96 | 61,7493 | 11,49707 |
| Más de 60 | 23 | 64,3478 | 8,58321 |
| Total | 459 | 63,6415 | 10,97717 |

F = 1,033 α = ,390

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 303
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 197 | 61,2782 | 10,11313 |
| Masculino | 242 | 65,5587 | 10,57730 |
| Mujer trans | 13 | 67,2667 | 16,82465 |
| Hombre trans | 7 | 57,1429 | 19,69006 |
| Total | 459 | 63,6415 | 10,97717 |

F = 7,065 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 304
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 52,1333 | 11,70451 |
| Alfabetizada | 6 | 61,6667 | 8,81917 |
| Primaria incompleta | 112 | 62,5804 | 10,99523 |
| Primaria completa | 73 | 65,4721 | 10,48581 |
| Secundaria incompleta | 53 | 65,1786 | 9,60094 |
| Secundaria completa | 108 | 66,4309 | 10,58625 |
| Universitaria incompleta | 33 | 64,4121 | 10,99220 |
| Universitaria completa | 8 | 61,6667 | 17,06663 |
| Post grado universitario | 1 | 63,3333 | , |
| Total | 400 | 64,4563 | 10,85787 |

F = 2,102 α = ,035

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 305
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 102 | 61,3516 | 10,77825 |
| Migró a otro país | 4 | 52,5000 | 3,19142 |
| No migró | 353 | 64,4295 | 10,94587 |
| Total | 459 | 63,6415 | 10,97717 |

F = 5,286 α = ,005

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 306
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 65,2318 | 11,77303 |
| Estudia y trabaja | 17 | 59,5765 | 12,60983 |
| Está desempleado | 100 | 62,3847 | 10,27989 |
| Es pensionado | 8 | 61,8750 | 7,36990 |
| Recibe Remesas | 9 | 61,4815 | 14,42039 |
| Solo estudia | 9 | 65,5556 | 9,68246 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 62,8069 | 8,89320 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 53,8933 | 13,50972 |
| Total | 458 | 63,6422 | 10,98916 |

F = 1,947 α = ,061

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 307
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 59,5455 | 12,67304 |
| Técnico medio | 33 | 65,8929 | 10,37789 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 68,8894 | 14,69982 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 66,0907 | 11,40591 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 65,0872 | 13,88867 |
| No calificadas | 108 | 63,1488 | 10,62167 |
| Total | 231 | 64,8156 | 11,90004 |

F = 1,970 α = ,084

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 308
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 65,1389 | 17,74480 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 65,4167 | 19,73787 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 73,7394 | 5,28229 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 65,4772 | 10,43924 |
| Servicio doméstico | 15 | 57,3333 | 9,83596 |
| Cuenta propia | 103 | 65,0977 | 12,22545 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 63,0917 | 10,86283 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 59,7619 | 9,59497 |
| Total | 231 | 64,8156 | 11,90004 |

F = 2,063 α = ,049

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 309
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 62,7143 | 10,22806 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 36,6667 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 43,3333 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 45,8333 | 3,53553 |
| Total | 116 | 62,0316 | 10,71144 |

F = 5,042 α = ,003

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 310
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 62,2556 | 14,45530 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 62,5926 | 13,02005 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 69,2857 | 9,61563 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 66,0000 | 12,96243 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 111 | 67,3183 | 9,38328 |
| Total | 173 | 66,0224 | 11,12804 |

F = 1,805 α = ,130

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 311
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 63,7500 | 19,46982 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 72,8000 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 76,6667 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 51,6667 | , |
| Total | 19 | 64,2702 | 18,37226 |

F = ,343 α = ,795

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 312
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 46,6667 | 3,84900 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 55,0980 | 9,85081 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 60,3333 | 8,99317 |
| De 1 o 2 años | 71 | 66,4404 | 11,20880 |
| De 3 a 5 años | 103 | 66,0362 | 9,09687 |
| De 6 a 10 años | 118 | 61,6350 | 10,67854 |
| Más de 10 años | 123 | 64,1154 | 11,84336 |
| No recuerda | 3 | 67,7778 | 5,09175 |
| Total | 459 | 63,6415 | 10,97717 |

F = 5,462 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 313
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 64,7170 | 10,55117 |
| Bueno | 183 | 64,2962 | 10,71069 |
| Estable | 105 | 62,9270 | 11,28898 |
| Malo | 23 | 57,5391 | 11,50738 |
| Muy Malo | 4 | 54,1667 | 11,66667 |
| Total | 458 | 63,6859 | 10,94794 |

F = 3,215 α = ,013

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 314
## USO DEL CONDÓN
## SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 67,3328 | 10,22975 |
| No | 225 | 59,9390 | 10,33438 |

t = 7,694 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# USO DEL LUBRICANTE

El nivel de uso del lubricante es inferior al observado para el condón. El promedio en este indicador es de 43,8 en una escala de 0 a 100. La desviación estándar es de 10,9, lo cual implica un grado de variabilidad muy pequeño de una persona a otra en el uso del lubricante (ver cuadro #315).




Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

El 72,3% de las personas entrevistadas se ubica en un nivel medio bajo de uso del lubricante, mientras que solamente un 0,2% alcanza un nivel muy alto (ver cuadro # 316 y gráfico #21).

El uso del lubricante resulta menor para las personas entre las personas que se identifican con el género femenino (ver cuadro #318), las que trabajan como técnicos medios (ver cuadro #322), las que trabajan como patronos con menos de 10 empleados (ver cuadro #323), entre los hombres que practican sexo tanto con mujeres como con hombre (ver cuadro #325) y entre las que no tienen una pareja estable (ver cuadro #329).

No existen diferencias en el uso del lubricante según edad (ver cuadro #317), nivel de estudios (ver cuadro #319), condición de migración (ver cuadro #320), nivel de actividad (ver cuadro #321), actividad sexual entre las mujeres (ver cuadro #324) y trans (ver cuadro

#326), tiempo desde el diagnóstico (ver cuadro #327) y percepción del estado de salud (ver cuadro #328).

## Cuadro # 315
## USO DE LUBRICANTE
**Estadísticas descriptivas**

| N | Mínimo | Máximo | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 18,00 | 76,50 | 43,7610 | 10,92509 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 316
## USO DE LUBRICANTE

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Muy bajo | 8 | 1,7 |
| Medio bajo | 332 | 72,3 |
| Medio alto | 118 | 25,7 |
| Muy alto | 1 | ,2 |
| Total | 459 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 317
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| 25 o menos | 47 | 42,2406 | 10,05638 |
| De 26 a 35 | 141 | 45,5445 | 11,00607 |
| De 36 a 45 | 152 | 43,3729 | 11,33226 |
| De 46 a 60 | 96 | 42,8831 | 11,12321 |
| Más de 60 | 23 | 42,1630 | 7,37610 |
| Total | 459 | 43,7610 | 10,92509 |

$F = 1,499$ $\alpha = ,201$

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 318
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Femenino | 197 | 41,9368 | 9,18664 |
| Masculino | 242 | 44,5485 | 11,52310 |
| Mujer trans | 13 | 54,1731 | 14,99423 |
| Hombre trans | 7 | 48,5357 | 13,23854 |
| Total | 459 | 43,7610 | 10,92509 |

F = 6,887 α = ,000

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 319
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No asistió a la escuela | 6 | 37,1250 | 5,99531 |
| Alfabetizada | 6 | 39,0000 | 2,32379 |
| Primaria incompleta | 112 | 43,7882 | 11,05397 |
| Primaria completa | 73 | 43,2567 | 10,51232 |
| Secundaria incompleta | 53 | 42,0011 | 11,32097 |
| Secundaria completa | 108 | 44,1750 | 12,17822 |
| Universitaria incompleta | 33 | 47,4327 | 11,22695 |
| Universitaria completa | 8 | 47,2500 | 12,95321 |
| Post grado universitario | 1 | 40,5000 | , |
| Total | 400 | 43,7488 | 11,26380 |

F = 1,141 α = ,335

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 320
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Migró dentro del país | 102 | 43,8759 | 11,30477 |
| Migró a otro país | 4 | 42,7500 | 2,59808 |
| No migró | 353 | 43,7392 | 10,88842 |
| Total | 459 | 43,7610 | 10,92509 |

F = ,023 α = ,977

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 321
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN A QUÉ SE DEDICA USTED

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo trabaja | 214 | 43,9637 | 12,19981 |
| Estudia y trabaja | 17 | 43,1471 | 9,94322 |
| Está desempleado | 100 | 44,8812 | 10,34331 |
| Es pensionado | 8 | 43,3125 | 8,97989 |
| Recibe Remesas | 9 | 44,9200 | 9,50379 |
| Solo estudia | 9 | 43,6700 | 12,75667 |
| Solo se dedica a tareas del hogar | 96 | 42,5091 | 8,99926 |
| No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas | 5 | 38,2500 | 3,18198 |
| Total | 458 | 43,7681 | 10,93597 |

F = ,542 α = ,803

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 322
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Profesional | 11 | 45,0000 | 13,64918 |
| Técnico medio | 33 | 39,6600 | 9,78219 |
| Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público | 41 | 49,5944 | 13,89993 |
| Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras | 25 | 45,0000 | 13,43735 |
| Calificadas de industrias, construcción y operación | 13 | 40,5000 | 14,81131 |
| No calificadas | 108 | 43,0842 | 10,36098 |
| Total | 231 | 43,9036 | 12,03154 |

F = 3,166 α = ,009

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 323
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN RELACIÓN LABORAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| No remunerado | 12 | 50,8125 | 13,03018 |
| Empleado del Gobierno o Institución | 4 | 43,8750 | 14,86817 |
| Empleado de Organización No Gubernamental | 11 | 55,4318 | 12,33496 |
| Empleado de empresa privada | 63 | 43,0371 | 10,81013 |
| Servicio doméstico | 15 | 40,6500 | 8,85690 |
| Cuenta propia | 103 | 43,3922 | 12,49535 |
| Patrono con menos de 10 empleados | 16 | 42,7500 | 10,61720 |
| Patrono con 10 o más empleados | 7 | 38,8929 | 11,67071 |
| Total | 231 | 43,9036 | 12,03154 |

F = 2,547 α = ,015

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 324
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 112 | 42,0694 | 9,70787 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 40,5000 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 40,5000 | , |
| Solo practica el sexo con mujeres | 2 | 34,8750 | 4,77297 |
| Total | 116 | 41,9183 | 9,59597 |

F = ,377 α = ,770

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 325
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 36 | 52,4175 | 12,35853 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 9 | 50,2500 | 10,31080 |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 7 | 48,2143 | 14,57340 |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 10 | 42,9030 | 13,02532 |
| Solo practica el sexo con mujeres | 111 | 43,9135 | 10,65169 |
| Total | 173 | 46,1284 | 11,74676 |

F = 4,411 α = ,002

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 326
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS TRANS

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Solo practica el sexo con hombres | 16 | 53,1563 | 14,22728 |
| Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres | 1 | 40,5000 | , |
| Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres | 1 | 72,0000 | , |
| Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres | 1 | 36,0000 | , |
| Total | 19 | 52,5789 | 14,60500 |

F = 1,323 α = ,304

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 327
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 mes | 4 | 39,7575 | 7,51500 |
| De 1 a 5 meses | 17 | 40,3253 | 5,48026 |
| De 6 a 11 meses | 20 | 40,2750 | 10,57613 |
| De 1 o 2 años | 71 | 44,7592 | 10,42165 |
| De 3 a 5 años | 103 | 45,3513 | 10,68242 |
| De 6 a 10 años | 118 | 43,2908 | 11,03022 |
| Más de 10 años | 123 | 43,4093 | 11,92014 |
| No recuerda | 3 | 46,5000 | 9,36750 |
| Total | 459 | 43,7610 | 10,92509 |

F = 1,082 α = ,374

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 328
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

| | N | Media | Desv, típ, |
|---|---|---|---|
| Muy Bueno | 143 | 45,1479 | 11,16765 |
| Bueno | 183 | 44,4074 | 10,88237 |
| Estable | 105 | 41,7009 | 11,20360 |
| Malo | 23 | 40,5000 | 7,21150 |
| Muy Malo | 4 | 39,3750 | 2,90474 |
| Total | 458 | 43,7779 | 10,93100 |

F = 2,368 α = ,052

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 329
## USO DE LUBRICANTE
## SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | N | Media | Desviación típ, |
|---|---|---|---|
| Sí | 233 | 45,1182 | 12,53420 |
| No | 225 | 42,3700 | 8,79885 |

t = 2,723 α = ,007

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# RELACIONES SEXUALES

Poco más de la mitad de las personas entrevistadas tenía una pareja estable al momento de la entrevista (ver cuadro #330).

Entre aquellas que sí la tenían, un 55,3% tienen una pareja con VIH (ver cuadro #331) y el 91,8% de las parejas conoce el diagnóstico de VIH de la persona entrevistada (ver cuadro #332).

En la última relación con la pareja estable, el 89,1% de las personas utilizó el condón (ver cuadro #333) y más de la mitad afirma que su uso es una decisión conjunta (ver cuadro #334). Entre las personas que no lo utilizaron, la principal razón se concentra en el hecho de que la pareja no quiere usarlo, seguida por la confianza en la pareja (ver cuadro #335). En términos generales, en el último año, el 75,2% de las personas afirma utilizar el condón todas las veces que tiene relaciones con su pareja estable (ver cuadro #336).

En lo que respecta al uso del lubricante, el mismo es bastante más bajo: solo un 52,7% afirma haberlo utilizado con su pareja estable en la última relación sexual (ver cuadro #337) y solamente un 38,6% afirma haberlo utilizado todas las veces en el último mes (ver cuadro #338).

Por otra parte, un 25,6% de las personas entrevistadas acepta haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales (ver cuadro #339).

Entre estas personas, el 87,7% afirma haber utilizado el condón en su última relación (ver cuadro #340). En el 69% de los casos es la persona entrevistada la que sugiere el uso del preservativo (ver cuadro #341). Entre las que no utilizaron el condón en la última relación, las principales razones para no usar el preservativo tienen que ver con rechazo por parte de la persona entrevistada o el no tenerlo a mano cuando lo necesitó (ver cuadro #342). En términos generales, el 69,6% afirma utilizar el condón en todas sus relaciones con parejas ocasionales (ver cuadro #343).

El lubricante fue utilizado en la última relación sexual con una pareja ocasional por solo por el 49,5% de las personas que lo conocen (ver cuadro #344).

El 71,9% de las personas no sabe si su última pareja ocasional es una Persona con VIH (ver cuadro #345) y solo el 3,5% acepta siempre decirle a su pareja ocasional sobre su diagnóstico (ver cuadro #346).

Solamente un 8,9% de las personas entrevistadas afirma haber tenido relaciones sexuales con una o un trabajador sexual en el último año (ver cuadro #347).

El 89,7% de estas personas afirma haber utilizado el condón en su última relación con un o una trabajadora sexual (ver cuadro #348). Entre las pocas personas que no lo utilizaron, la principal razón es porque no les gusta hacerlo o que no lo tenían en el momento en que lo necesitaron (ver cuadro #349). El uso del condón es sistemático en el 62,5% de las relaciones sexuales comerciales (ver cuadro #350).

El lubricante es utilizado solo en el 37,1% de las personas que han tenido en el último año relaciones sexuales con trabajadores sexuales (ver cuadro #351).

Solo el 12,5% de las personas le dice a su pareja sexual comercial que es una Persona con VIH (ver cuadro #352) y el 77,5% no sabe si su última pareja lo era (ver cuadro #353).

El 55,4% de las personas entrevistadas afirma que su última pareja sexual fue su pareja estable, mientras que un 15,8% dice que fue una pareja ocasional (ver cuadro #354).

El 79,3% utilizó el condón con su última pareja (ver cuadro #355). Un 27,8% acepta haber tenido alguna vez relaciones sexuales sin condón (ver cuadro #356), un 12,8% ha tenido relaciones anales sin condón (ver cuadro #357) y un 9,8% dice que un hombre eyaculó en su boca sin usar condón (ver cuadro #358).

El uso del lubricante con la última pareja sexual es de apenas un 40,7% de los casos (ver cuadro #359).

Por último, un 6,8% de las personas afirma haber desarrollado trabajo sexual comercial (ver cuadro #360). De estas, el 74,2% nunca le dice a sus clientes que es una persona VIH (ver cuadro #361).

El uso del condón en la última relación como trabajador/a sexual fue de un 80% (ver cuadro #362) y en el 91,7% de los casos fue la persona entrevistada quien sugirió su uso (ver cuadro #363). Entre las que no lo usaron, la principal razón fue porque el cliente le pagó más o porque la persona entrevistada no quiso usarlo (ver cuadro #364). En términos generales, el 64,5% de estas personas afirma utilizar el condón en sus relaciones sexuales comerciales (ver cuadro #365). Cuando deja de hacerlo, es, en su mayoría, porque el cliente le insiste (ver cuadro #366).

El lubricante fue utilizado solo en el 64,3% de los casos (ver cuadro #367) y en general el 57,1% afirma utilizarlo siempre con sus clientes (ver cuadro #368).

## Cuadro # 330
## ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 233 | 50,9 |
| No | 225 | 49,1 |
| Total | 458 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 331
## SU PAREJA ESTABLE ES UNA PERSONA CON VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 126 | 55,3 |
| No | 102 | 44,7 |
| Total | 228 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 5 |
| No tiene pareja estable | | 226 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 332
## SU PAREJA ESTABLE SABE QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 214 | 91,8 |
| No | 19 | 8,2 |
| Total | 233 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No tiene pareja estable | | 226 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 333
## USARON CONDÓN EN ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 204 | 89,1 |
| No | 25 | 10,9 |
| Total | 229 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 4 |
| No tiene pareja estable | | 226 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 334
## QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Usted misma/o | 72 | 35,3 |
| Su pareja | 11 | 5,4 |
| Decisión conjunta | 121 | 59,3 |
| Total | 204 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No tiene pareja estable | | 226 |
| No usaron el condón | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 335
## POR QUÉ NO USARON CONDÓN
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mi pareja no quiso usarlo | 10 | 40,0 |
| Confío en mi pareja | 7 | 28,0 |
| No me gusta usarlo | 5 | 20,0 |
| No tenía un condón en ese momento | 1 | 4,0 |
| Los condones no funcionan | 1 | 4,0 |
| Otra | 8 | 32,0 |
| Total | 32 | 128,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 336
## CON QUÉ FRECUENCIA USÓ USTED CONDONES EL ÚLTIMO AÑO

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Todas las veces | 173 | 75,2 |
| La gran mayoría de las veces | 21 | 9,1 |
| A menudo | 9 | 3,9 |
| Pocas veces | 9 | 3,9 |
| Casi nunca | 9 | 3,9 |
| Nunca | 9 | 3,9 |
| Total | 230 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 3 |
| No tiene pareja estable | | 226 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 337
## USARON LUBRICANTE EN ÚLTIMA RELACIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 106 | 52,7 |
| No | 95 | 47,3 |
| Total | 201 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 3 |
| No tiene pareja estable | | 226 |
| No conoce los lubricantes | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 338
## CON QUÉ FRECUENCIA USÓ USTED LUBRICANTE EN ÚLTIMO MES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Todas las veces | 78 | 38,6 |
| La gran mayoría de las veces | 23 | 11,4 |
| A menudo | 17 | 8,4 |
| Pocas veces | 29 | 14,4 |
| Casi nunca | 14 | 6,9 |
| Nunca | 41 | 20,3 |
| Total | 202 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 2 |
| No tiene pareja estable | | 226 |
| No conoce los lubricantes | | 29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 339
## HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS OCASIONALES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 116 | 25,6 |
| No | 338 | 74,4 |
| Total | 454 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 5 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 340
## USARON UN CONDÓN EN ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 100 | 87,7 |
| No | 14 | 12,3 |
| Total | 114 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 2 |
| No ha tenido parejas ocasionales | | 343 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 341
## QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Usted misma/o | 69 | 69,0 |
| Su pareja | 15 | 15,0 |
| Decisión conjunta | 16 | 16,0 |
| Total | 100 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha tenido parejas ocasionales | | 343 |
| No usaron condón | | 16 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 342
## POR QUÉ NO USARON CONDÓN
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| No me gusta usarlo | 4 | 30,8 |
| No tenía un condón en ese momento | 4 | 30,8 |
| Mi pareja no quiso usarlo | 3 | 23,1 |
| Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas | 1 | 7,7 |
| Otra | 1 | 7,7 |
| Total | 13 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 343
## CON QUÉ FRECUENCIA USA CONDÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Todas las veces | 80 | 69,6 |
| La gran mayoría de las veces | 18 | 15,7 |
| A menudo | 5 | 4,3 |
| Pocas veces | 5 | 4,3 |
| Casi nunca | 3 | 2,6 |
| Nunca | 4 | 3,5 |
| Total | 115 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 1 |
| No ha tenido parejas ocasionales | | 343 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 344
## USARON LUBRICANTE EN ÚLTIMA RELACIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 52 | 49,5 |
| No | 53 | 50,5 |
| Total | 105 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha tenido parejas ocasionales | | 343 |
| No conoce los lubricantes | | 11 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 345
## LA ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL TIENE EL VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 8 | 7,0 |
| No | 24 | 21,1 |
| No sabe | 82 | 71,9 |
| Total | 114 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 2 |
| No ha tenido parejas ocasionales | | 343 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 346
## USTED LES DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Siempre | 4 | 3,5 |
| A veces | 11 | 9,6 |
| Nunca | 99 | 86,8 |
| Total | 114 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 2 |
| No ha tenido parejas ocasionales | | 343 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 347
## HA TENIDO RELACIONES CON TRAVAJADORAS/ES SEXUALES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 40 | 8,9 |
| No | 409 | 91,1 |
| Total | 449 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 10 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 348
## USARON UN CONDÓN EN ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| SÍ | 35 | 89,7 |
| No | 4 | 10,3 |
| Total | 39 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |
| No ha tenido relaciones con trabajadoras | | 419 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 349
## POR QUÉ NO USARON CONDÓN
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| No me gusta usarlo | 1 | 33,3 |
| No tenía un condón en ese momento | 1 | 33,3 |
| Otra | 1 | 33,3 |
| Total | 3 | 100,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 350
## CON QUÉ FRECUENCIA USA CONDÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Todas las veces | 25 | 62,5 |
| La gran mayoría de las veces | 11 | 27,5 |
| A menudo | 1 | 2,5 |
| Pocas veces | 2 | 5,0 |
| Nunca | 1 | 2,5 |
| Total | 40 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha tenido relaciones con trabajadoras | | 419 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 351
## USARON LUBRICANTE EN ÚLTIMA RELACIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 13 | 37,1 |
| No | 22 | 62,9 |
| Total | 35 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha tenido relaciones con trabajadoras | | 419 |
| No conoce los lubricantes | | 5 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 352
## USTED LES DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 5 | 12,5 |
| No | 35 | 87,5 |
| Total | 40 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha tenido relaciones con trabajadoras | | 419 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 353
## SABE USTED SI ALGUNA PAREJA TRABAJADORA SEXUAL TENÍA VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 3 | 7,5 |
| No | 6 | 15,0 |
| No Sabe | 31 | 77,5 |
| Total | 40 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha tenido relaciones con trabajadoras | | 419 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 354
## ÚLTIMA PAREJA SEXUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Pareja estable, vive con ella | 221 | 55,4 |
| Pareja estable, no vive con ella | 87 | 21,8 |
| Cliente | 14 | 3,5 |
| Pareja ocasional | 63 | 15,8 |
| Pareja comercial | 4 | 1,0 |
| Desconocido/a | 10 | 2,5 |
| Total | 399 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 60 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 355
## USARON UN CONDÓN EN ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 325 | 79,3 |
| No | 85 | 20,7 |
| Total | 410 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 49 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 356
## ALGUNA VEZ HA TENIDO RELACIONES SEXUALES SIN USAR UN CONDÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 117 | 27,8 |
| No | 304 | 72,2 |
| Total | 421 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 38 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 357
## ALGUNA VEZ HA TENIDO RELACIONES ANALES SIN QUE USARAN UN CONDÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 54 | 12,8 |
| No | 367 | 87,2 |
| Total | 421 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 38 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 358
## ALGÚN HOMBRE SE VINO O EYACULÓ EN SU BOCA SIN USAR CONDÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 38 | 9,8 |
| No | 350 | 90,2 |
| Total | 388 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 71 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 359
## USARON LUBRICANTE EN ÚLTIMA RELACIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 149 | 40,7 |
| No | 217 | 59,3 |
| Total | 366 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 35 |
| No conoce los lubricantes | | 58 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 360
## HA REALIZADO USTED TRABAJO SEXUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 31 | 6,8 |
| No | 424 | 93,2 |
| Total | 455 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 4 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 361
## LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Siempre | 4 | 12,9 |
| A veces | 4 | 12,9 |
| Nunca | 23 | 74,2 |
| Total | 31 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha desarrollado trabajo sexual | | 428 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 362
## USARON UN CONDÓN EN ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 24 | 80,0 |
| No | 6 | 20,0 |
| Total | 30 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 1 |
| No ha desarrollado trabajo sexual | | 428 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 363
## QUIÉN PROPUSO EL USO DEL CONDÓN EN ESA OCASIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Usted misma/o | 22 | 91,7 |
| Su cliente | 2 | 8,3 |
| Total | 24 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha desarrollado trabajo sexual | | 428 |
| No utilizaron condón | | 7 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 364
## POR QUÉ NO USARON CONDÓN
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| El cliente me pago más | 3 | 75,0 |
| El no quiso usar | 3 | 75,0 |
| Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas | 2 | 50,0 |
| Creo que está sano | 1 | 25,0 |
| No tenía un condón en ese momento | 1 | 25,0 |
| Los condones son muy caros | 1 | 25,0 |
| Total | 11 | 275,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 365
## CON QUE FRECUENCIA USA USTED EL CONDÓN CON SUS CLIENTES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Todas las veces | 20 | 64,5 |
| La gran mayoría de las veces | 4 | 12,9 |
| A menudo | 1 | 3,2 |
| Pocas veces | 2 | 6,5 |
| Casi nunca | 1 | 3,2 |
| Nunca | 1 | 3,2 |
| No contesta | 2 | 6,5 |
| Total | 31 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No ha desarrollado trabajo sexual | | 428 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 366
## ¿CUÁNDO DEJA DE USAR EL CONDÓN?
(respuesta múltiple)

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| El cliente insiste mucho | 4 | 57,1 |
| Consume drogas o alcohol | 3 | 42,9 |
| El cliente paga más | 3 | 42,9 |
| Hace sexo oral | 3 | 42,9 |
| Es un cliente fijo | 2 | 28,6 |
| Revisa al cliente y se ve sano | 2 | 28,6 |
| Otra | 1 | 14,3 |
| Total | 18 | 257,1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 367
## USARON LUBRICANTE EN ÚLTIMA RELACIÓN

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Sí | 18 | 64,3 |
| No | 10 | 35,7 |
| Total | 28 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No Contesta | | 2 |
| No ha desarrollado trabajo sexual | | 428 |
| No conoce los lubricantes | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

## Cuadro # 368
## CON QUE FRECUENCIA USA USTED LUBRICANTE CON SUS CLIENTES

| | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---|---|---|
| Todas las veces | 16 | 57,1 |
| La gran mayoría de las veces | 4 | 14,3 |
| A menudo | 1 | 3,6 |
| Pocas veces | 2 | 7,1 |
| Casi nunca | 2 | 7,1 |
| Nunca | 3 | 10,7 |
| Total | 28 | 100,0 |
| Personas fuera del análisis | | |
| No contesta | | 2 |
| No ha desarrollado trabajo sexual | | 428 |
| No conoce los lubricantes | | 1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo de datos del estudio Perfil de Riesgo en Guatemala, REDCA+, 2017

# CONCLUSIONES

1- La mayoría de las personas entrevistadas tiene edades comprendidas entre los 26 y los 45 años. El 42,9% de las personas entrevistadas se identifican como del género femenino y un 52,7% del masculino; mientras que solamente 20 personas se identificaron como trans, 13 como trans femeninas y 7 como trans masculino.

El nivel educativo tiende a ser bajo, con cerca de un 30% de las personas entrevistadas con primaria incompleta o menos.

La mayor parte de las personas vive con su familia, aunque solo la mitad tiene una pareja estable.

Un 23,1% de las personas afirma haber cambiado de residencia después de conocer su diagnóstico de VIH, cambio que se realiza sobre todo para buscar mejores condiciones laborales, de vivienda o de comunidad. El traslado de residencia tiende a generar en algunas pocas personas problemas de acceso a los servicios de salud.

Cerca de la mitad de las personas no contaba con un trabajo remunerado al momento de la entrevista, con una proporción importante desempleada o dedicada a las tareas del hogar. Entre las que sí trabajan, muchos lo hacen en actividades no calificadas con un 44,6% como cuenta propia, lo que sugiere una proporción importante en el sector informal. El ingreso tiende a ser limitado y difícilmente alcanza para cubrir las necesidades de la persona entrevistada y de sus familiares. La mayor parte de las personas tienen de dos a cinco dependientes.

2- El nivel de participación en grupos de autoayuda es bastante bajo y apenas moderada la asistencia a actividades relacionadas con el VIH.

Existe una alta disposición a contribuir en el control de la epidemia, pero las acciones sugeridas tienden a ser individuales con poca conciencia de comunidad dentro de la población de Personas con VIH.

La percepción de las acciones de incidencia política tiende a ser más bien baja.

3- Las personas entrevistadas tienden a mostrar en general una buena perspectiva de futuro, con una amplia mayoría con planes concretos para los próximos años, con el convencimiento de que pueden cambiar positivamente su situación y con la fe de que el futuro será mejor que el presente.

4- El nivel de conocimientos sobre VIH es moderadamente bueno, con proporciones altas respondiendo correctamente a los diferentes ítemes.

5- Existe un acceso alto al control médico y una asistencia igualmente alta al mismo. Esto está asociado a una tendencia bastante generalizada a cuidar más de su salud desde que se enteraron de su diagnóstico de VIH. Pero se mantiene una proporción que no ha recibido algún tipo de consejería antes de realizarse la prueba que resultó en el diagnóstico de VIH.

La mayoría de las personas dice recibir orientación al cambiársele el esquema de antirretrovirales y normalmente se le solicita su consentimiento.

La percepción del estado de salud es por lo general muy positiva y esta sensación se asocia positivamente con actitudes y prácticas preventivas.

6- El 93,7% de las personas aseguran estar en tratamiento antirretroviral en el momento de la entrevista y todas reciben sus medicamentos en forma completa y gratuita en el centro de salud.

Se menciona una lista muy grande de diferentes medicamentos que se estaban tomando en el momento de la entrevista, pero sobresalen con mayor mención Atripla, Efavirenz, y Lamivudina.

La percepción del tratamiento antirretroviral tiende a ser muy positiva. La mayoría de las personas considera que quien lo sigue se enferma menos y vive más. Esta visión positiva del tratamiento se asocia de manera importante con actitudes y hábitos de salud preventivos.

Poco menos de la mitad de las personas que se encuentran en tratamiento menciona haber tenido efectos secundarios adversos, aunque 30,5% dice que han sido livianos.

7- La adherencia al tratamiento antirretroviral es de 87,6% entre las personas entrevistadas.

Entre las principales razones para interrumpir el tratamiento sobresalen los efectos secundarios, la dificultad para trasladarse y la dificultad de recordar.

Por otra parte, un 10,7% acepta haber dejado de tomar los medicamentos para poder ingerir alcohol y otras drogas. Del mismo modo, un 8,4% ha olvidado retirar los medicamentos en algún momento en los últimos 12 meses y un 3,3% dice que en el centro de salud le han dejado de suministrar al menos una vez los medicamentos.

8- La gran mayoría de las personas entrevistadas se ha realizado los exámenes CD4 y de carga viral en los últimos doce meses, pero permanece una proporción que afirma desconocer sus resultados.

9- Pocas de las personas entrevistadas ha recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis. Un 11,3% ya ha sufrido la enfermedad, aunque, en general, estas últimas personas sí han recibido el tratamiento adecuado.

10- En lo que respecta a la orientación para prevenir la hepatitis B, solo un 17,6% de las personas la ha recibido y un 2,2% ha sufrido esta enfermedad.

11- Existe un nivel moderadamente bajo de victimización por la condición de ser Persona con VIH. Concretamente, un 7,8% afirma haber recibido maltrato en los servicios de salud y un 25,9% considera necesario siempre ocultar su diagnóstico al ser atendido. A un 11,6% se le ha obligado a hacerse el examen de VIH por razones laborales.

A pesar de lo anterior, el apoyo de la familia resulta en general alto y positivo.

12- El riesgo en las relaciones sexuales es moderado.

Un 25,6% acepta haber tenido parejas ocasionales y de estas un 71,9% desconoce si las mismas son personas VIH y solo un 3,5% acepta decirles su diagnóstico de VIH.

Un 8,9% ha tenido en el último año relaciones con trabajadores o trabajadoras sexuales y un 6,8% afirma haber desarrollado trabajo sexual comercial.

13- El uso del condón es apenas moderado con las diferentes modalidades de parejas sexuales. El uso en la última relación es de 89,1% con parejas estables, de 87,7% con parejas ocasionales, de 89,7% con trabajadores o trabajadoras sexuales y 80% entre las personas que aceptan haber practicado trabajo sexual.

14- El uso del lubricante es muy bajo, aunque la gran mayoría conoce de su existencia.

15- En relaciones con parejas ocasionales o en sexo comercial llama la atención las proporciones de personas que ignoran si su pareja es una Persona con VIH o que no le dicen a su pareja su situación.

16- El nivel educativo muestra relaciones muy importantes con actitudes y con conductas preventivas y obviamente también con el nivel de conocimientos sobre el VIH, por lo que se constituye en un predictor frecuente de los diferentes indicadores analizados.

17- Llama la atención el hecho de que otro de los predictores frecuentes de los diferentes indicadores lo constituye el tiempo que ha transcurrido desde que se recibió el diagnóstico de VIH. Lo anterior sugiere un proceso de maduración que permite aprender a vivir con el virus en forma saludable y responsable.

18- Otra variable predictora importante es la situación de migración, en donde aquellas personas que han tenido que migrar a otro país muestran en general condiciones más negativas. Del mismo modo, las mujeres trans tienden a mostrar peores condiciones y mayores niveles de victimización.

# RECOMENDACIONES

1- La condición socioeconómica de la población estudiada resulta bastante limitada, con bajo nivel educativo, alto desempleo, importante presencia de economía informal, ingresos limitados y muchos dependientes. Conviene, por lo tanto, pensar en mecanismos que puedan desarrollarse para incrementar las opciones de empleo o de producción y mejoramiento del nivel educativo.

2- La participación tiende a ser muy baja y hay poca conciencia de las opciones colectivas. Cualquier esfuerzo en el sentido de mejorar la identidad y la participación redundará en mayor disposición para la incidencia política y en mejores opciones de apoyo y promoción de derechos y de mejoras en la calidad de vida, lo cual a su vez redundará en una perspectiva de vida aún más alta.

3- Resulta necesaria desarrollar mayores esfuerzos de prevención de la salud sexual, especialmente entre los hombres.

4- Prevalece una proporción nada desdeñable de personas que dice sufrir maltrato por su diagnóstico o que tiene que esconderlo al solicitar atención. La capacitación y sensibilización del personal de salud resulta entonces fundamental para reducir victimización y para incrementar el uso de los servicios y mejorar la calidad de los mismos. También resulta importante algún esfuerzo de divulgación entre empleadores para impedir que se obligue a las personas a hacerse el examen de VIH.

5- Aunque la cantidad de personas que se mantienen en tratamiento antirretroviral es muy alta, prevalece una proporción que reconoce haberlo suspendido al menos una vez. Conviene trabajar en este punto las principales razones de esta suspensión.

6- Pareciera mantenerse algún problema con el reporte de los resultados de los exámenes de laboratorio, por lo que se hace necesaria una coordinación con los centros de salud para promover una entrega más sistemática de los reportes a cada paciente.

7- Existe una proporción relativamente alta que asegura no haber recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis y sobre todo la hepatitis B, por lo que es importante evaluar este servicio particular en los centros de salud.

8- El uso del condón sigue siendo apenas moderado. Deben intensificarse los esfuerzos para lograr aumentar las proporciones de uso sistemático. De acuerdo con las razones esgrimidas para no utilizarlo, es importante una mayor sensibilización entre las Personas con VIH para vencer las resistencias asociadas al condón, pero sobre todo para generar habilidades más asertivas para que puedan exigir a sus parejas este uso sistemático.

9- En el caso del lubricante es importante incrementar esfuerzos para aumentar la disponibilidad amplia para toda la población de Personas con VIH y un uso sistemático del mismo.

10- Debe ponerse también atención a la distribución de condones, pues pareciera que el acceso es bajo.